

前言

國中已畢業，高中未開學前的暑假是一段相當美好的假期。然而快樂的時光總是過得特別快，當你翻開這本書的時候，意味著高中新生活即將展開。是的，就當作是為了一場球賽前的熱身吧！藉由演練本書，喚起全身的細胞，活動筋骨與思路，為高中學習階段做好充足的準備。

本書以簡明、好教、易學為原則，總共分成六大單元：

- 一、乘法公式
- 二、根式運算
- 三、數列與級數
- 四、坐標與函數
- 五、三角比
- 六、立體圖與三視圖

一至五單元皆有兩階段：

第一階段「國中複習」：

嚴選國中學過的觀念，可作為高中學習的基礎，並提供十二題「國中基礎能力檢定」。

第二階段「高中先修課程」：


提示高中即將展開的部分內容，並提供八題「先修銜接能力檢定」。最後有五題「綜合能力檢定」。

第六單元主要複習國中所學內容，未來將會應用在不同的高中課程單元。


本書的完成，期望能提供一份學生可以自行學習的教材。在架構上，也希望能提供教師同仁在課堂教學上的便利，不論是單元的選擇，時間的掌控，作業的編派都可以藉由本書的設計順利地執行。

本書的編寫理念期許能為高中數學教師的教學及未來的高一學生提供一份有效且好用的銜接教材，在編寫過程力求完美，如有疏漏或未盡合宜，敬請各位數學先進不吝指教。

編者 謹識



目次



單元 1	乘法公式.....	3
單元 2	根式運算.....	13
單元 3	數列與級數.....	24
單元 4	坐標與函數.....	36
單元 5	三角比.....	49
單元 6	立體圖與三視圖.....	62
解答篇.....		65



1. 運算法則

- (1) 交換律： $a+b=b+a$ ； $a \times b=b \times a$ 。
- (2) 結合律： $(a+b)+c=a+(b+c)$ ； $(a \times b) \times c=a \times (b \times c)$ 。
- (3) 分配律：① $a \times (b \pm c)=a \times b \pm a \times c$ 。
② $(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$ 。

2. 最簡分數

若一個分數的分子與分母互質，則稱此分數為最簡分數。

3. 乘法公式

- (1) 和的平方公式： $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ 。
- (2) 差的平方公式： $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ 。
- (3) 平方差公式： $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ 。
- (4) $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)$ 。

4. 公式的變化

- (1) $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab$ 。
- (2) $a^2+b^2=(a-b)^2+2ab$ 。
- (3) $(a-b)^2=(a+b)^2-4ab$ 。
- (4) $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=x^2+\frac{1}{x^2}+2$ 。
- (5) $\left(x-\frac{1}{x}\right)^2=x^2+\frac{1}{x^2}-2$ 。

5. 指數律

設 $a \neq 0$ ， $b \neq 0$ ， m 、 n 為正整數，則：

- (1) $a^m \times a^n=a^{m+n}$ 。
- (2) $a^m \div a^n=a^{m-n}$ 。
- (3) $(a^m)^n=a^{mn}$ 。
- (4) $(a \times b)^m=a^m \times b^m$ 。

6. 科學記號

將一個正數 a 表成 $a=b \times 10^n$ 的型式，其中 n 為整數，且 $1 \leq b < 10$ 。



國中基礎能力檢定

1. 已知 $15 \times 16 \times 17 = 4080$ ，則 $(-15) \times (-16) \times (-17) =$ _____。

解

2. 計算 $(88.8)^2 - (11.2)^2 =$ _____。

解

3. 計算 $(3 - \sqrt{5})^3 (3 + \sqrt{5})^3 =$ _____。

解

4. 已知 $108 \times 25 = 2700$ ，計算 $108 \times 25^3 - 2699 \times 25^2 =$ _____。

解

5. 計算 $\frac{2019^2 - 2 \times 2019 + 1}{2018} - \frac{108^2 + 2 \times 108 \times 1911 + 1911^2}{2019} =$ _____。

解

6. 已知 $a-b=10$ ， $ab=-6$ ，則 $a^2+b^2=$ _____。

解

7. 已知 $\alpha+\beta=6$ ， $\alpha\beta=3$ ，則 $\frac{\beta+1}{\alpha}+\frac{\alpha+1}{\beta}=$ _____。

解

8. 已知 a, b, c, d 為實數，且 $(a^2+2a+1)+\left(b^2+b+\frac{1}{4}\right)+\left(c^2-c+\frac{1}{4}\right)+(d^2-2d+1)=0$ ，則 $a+b+c+d=$ _____。

解

9. 已知 $x^2-3x+1=0$ ，則 $x^2+\frac{1}{x^2}=$ _____。

解

10. 已知 $A = (3-1)(3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1)$ ，則 A 的個位數字為何？

(A) 0 (B) 2 (C) 6 (D) 8。

答 _____。


解

11. 如右圖，鋪色部分的面積可以下列哪一個選項表示？

(A) $a^2 - b^2$ (B) $a^2 + b^2$ (C) $2ab$ (D) $2\sqrt{2}ab$ 。

答 _____。

解



12. 所謂「PM 2.5」是指粒徑小於 2.5 微米的細微懸浮微粒，而登革熱病毒則是直徑約 30~50 奈米的球形病毒。已知 1 微米 = 10^{-6} 公尺，1 奈米 = 10^{-9} 公尺，試問 2.5 微米是 50 奈米的多少倍？

(A) 5 倍 (B) 20 倍 (C) 50 倍 (D) 200 倍。

答 _____。

解



高中先修課程



銜接焦點 1

立方公式

1. $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ 。

2. $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$ 。

說明：

$$(1) \begin{aligned} (a+b)^3 &= (a+b)^2(a+b) = (a^2+2ab+b^2)(a+b) \\ &= a^3+a^2b+2a^2b+2ab^2+b^2a+b^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3。 \end{aligned}$$

$$(2) \begin{aligned} (a-b)^3 &= (a-b)^2(a-b) = (a^2-2ab+b^2)(a-b) \\ &= a^3-a^2b-2a^2b+2ab^2+b^2a-b^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3。 \end{aligned}$$

$$(3) a^3+b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)。$$

$$(4) a^3-b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)。$$

例題 1

已知 $a+b=5$ ， $ab=-3$ ，則：

(1) $a^2+b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $a^3+b^3 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

練習 1

已知 $a-b=3$ ， $ab=1$ ，則：

(1) $a^2+b^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $a^3-b^3 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解



銜接焦點 2

公式推廣

$$1. \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = x^3 + \frac{1}{x^3} + 3\left(x + \frac{1}{x}\right)。$$

$$2. \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 = x^3 - \frac{1}{x^3} - 3\left(x - \frac{1}{x}\right)。$$

說明：

$$(1) \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot \left(\frac{1}{x}\right) + 3 \cdot x \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2 + \left(\frac{1}{x}\right)^3 = x^3 + \frac{1}{x^3} + 3\left(x + \frac{1}{x}\right)。$$

$$(2) \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 = x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot \left(\frac{1}{x}\right) + 3 \cdot x \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^2 - \left(\frac{1}{x}\right)^3 = x^3 - \frac{1}{x^3} - 3\left(x - \frac{1}{x}\right)。$$

$$(3) a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})。$$

$$(4) x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + x^{n-3} + \cdots + 1)。$$

例題 2

已知 $x + \frac{1}{x} = 3$ ，則：

$$(1) x^2 + \frac{1}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

$$(2) x^3 + \frac{1}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

解

練習 2

已知 $x - \frac{1}{x} = 5$ ，則：

$$(1) x^2 + \frac{1}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

$$(2) x^3 - \frac{1}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

解



先修銜接能力檢定

1. 已知 $a=99$ ， $b=1$ ，則 $a^3+b^3=$ _____。

解

2. 已知 $a-b=5$ ， $ab=3$ ，則 $a^4b-ab^4=$ _____。

解

3. 已知 $a+b=3$ ， $ab=1$ ，則 $\frac{b^2}{a}+\frac{a^2}{b}=$ _____。

解

4. 已知 $x+\frac{1}{x}=3$ ，則 $x^5+\frac{1}{x^5}=$ _____。

解

5. 已知 $a^2 + \frac{1}{a^2} = 3$ ，則 $a^6 + \frac{1}{a^6} =$ _____。

解

6. $2^9 + 2^8 + 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2 + 1$ 之值為_____。

解

7. $3^5 + 3^4 \times 2 + 3^3 \times 2^2 + 3^2 \times 2^3 + 3 \times 2^4 + 2^5$ 之值為_____。

解

8. 某個手機程式，每次點擊螢幕上的數 a 後，螢幕上的數會變成 a^2 。當一開始時螢幕上的數 b 為正且連續點擊螢幕三次後，螢幕上的數接近 81^4 。試問實數 b 最接近下列哪一個選項？
(A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 9。

答 _____。

解



綜合能力檢定

1. 小於 $(99.8)^2$ 的最大整數為下列何者？
(A) 9990 (B) 9980 (C) 9970 (D) 9960。

答 _____。

解

2. 設 a, b 為實數，若 $a+b=1$ ， $a^2+b^2=2$ ，則 $a^3+b^3=$ _____。

解

3. 若 a 是方程式 $x^2-4x+2=0$ 的一個解，則 $a^3+\frac{8}{a^3}=$ _____。

解

4. 若 $a-b=2+\sqrt{2}$ ， $b-c=2-\sqrt{2}$ ，則 $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ 之值為下列何者？


(A) 14 (B) 28 (C) $4\sqrt{6}+4$ (D) $4\sqrt{6}-4$ 。

答 _____。

解

5. 已知 $\alpha > 0$ 且 $\beta > 0$ ，若 $\alpha^n - \beta^n = 0$ ，其中 n 為正整數，試說明 $\alpha = \beta$ 。

解



1. 平方根

已知 $a \geq 0$ ，則 $x^2 = a$ 表示

- (1) a 是 x 的平方。
- (2) x 是 a 的平方根，即 $x = \pm\sqrt{a}$ 。

2. 根式

- (1) $\sqrt[n]{a}$ 稱為二次方根，可省略「2」簡寫為 $\sqrt{a}$ 。
- (2) $\sqrt[n]{a}$ ：其中稱 n 為開方次數，稱 a 為被開方數，
稱 $\sqrt[n]{a}$ 為 a 的 n 次方根。
- (3) 二次根式 $\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a, & \text{當 } a \geq 0。 \\ -a, & \text{當 } a < 0。 \end{cases}$
- (4) 若 a 為完全平方數，則 $\sqrt{a}$ 必為整數。
- (5) 若 $a = m^2 \times k$ ，則 $\sqrt{a} = \sqrt{m^2 \times k} = m\sqrt{k}$ ，
其中 $m > 0$ 且 $k > 0$ 。
- (6) $\sqrt[3]{a^3} = a$ 。
- (7) 當 n 為奇數，則 $\sqrt[n]{a^n} = a$ ；
當 n 為偶數，則 $\sqrt[n]{a^n} = |a|$ 。

3. 同類方根

例如 $3\sqrt{2}$ ， $6\sqrt{2}$ 皆有「 $\sqrt{2}$ 」，稱之為同類方根，可以加減乘除。

4. 同次方根

例如 $\sqrt{2}$ ， $\sqrt{3}$ ， $\sqrt{11}$ 皆為「二次方根」，可乘除，不可加減。

5. 根式的乘除

- (1) 若 a, b 為正數或 0，則 $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 。
- (2) 若 a, b 為任意實數，則 $\sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b} = \sqrt[3]{ab}$ 。
- (3) 若 $a \geq 0, b > 0$ ，則 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ 。
- (4) 若 a, b 為任意實數，其中 $b \neq 0$ ，則 $\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}} = \sqrt[3]{\frac{a}{b}}$ 。



6. 畢氏定理

一個直角三角形兩股長分別為 a 、 b ，斜邊為 c ，則 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，如圖(一)。

7. 距離公式

在直角坐標平面上，已知 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ ，

則 A 、 B 兩點的距離為 $\overline{AB} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ ，如圖(二)。



8. 根式分母有理化

$$(1) \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}。$$

$$(2) \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}。$$

$$(3) \frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}。$$

$$(4) \frac{1}{a - \sqrt{b}} = \frac{a + \sqrt{b}}{a^2 - b}。$$



國中基礎能力檢定

1. 若 $x^2 - 12x + 45$ 的平方根為 ± 3 ，則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

2. 化簡 $4\sqrt{12} + 2\sqrt{27} - 3\sqrt{48} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

3. 化簡 $\sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{4} \times \sqrt{5} \times \sqrt{6} \times \sqrt{8} \times \sqrt{9} \times \sqrt{10} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

4. 已知 $a = 2\sqrt{6}$ ， $b = 3\sqrt{3}$ ， $c = 4\sqrt{2}$ ，下列哪一個選項是正確的？

(A) $a > b > c$ (B) $b > c > a$ (C) $c > a > b$ (D) $c > b > a$ 。

答 。

解

5. 若 n 為正整數且 $\sqrt{108-n}$ 亦為正整數，則符合條件的 n 有_____個。

解

6. 若 n 為正整數且 $\sqrt{108 \times n}$ 亦為正整數，則符合條件的最小 n 值為_____。

解

7. 已知 $-3 < a < 1$ ，則 $\sqrt{(a-1)^2} + \sqrt{(a+3)^2}$ 等於下列哪一個選項？

(A) 4 (B) -4 (C) $2a+2$ (D) $-2a-2$ 。

答 _____。

解

8. 求值： $\frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2-\sqrt{2}} + \frac{1}{2+\sqrt{2}} =$ _____。


解

9. 如右圖，以 $O(0)$ 為圓心， $\overline{OB}$ 為半徑畫弧，交數線於點 P ，則點 P 的坐標為下列何者？

(A) $4\sqrt{5}$ (B) $3\sqrt{6}$ (C) $2\sqrt{10}$ (D) $\sqrt{38}$ 。

答 _____。

解




10. 已知有一最新手機號稱為 6.1 吋螢幕(即對角線長 6.1 吋)，若螢幕長度為 5 吋，則螢幕寬度大約為多少吋？

(A) 2 吋 (B) 2.5 吋 (C) 3 吋 (D) 3.5 吋。


答 _____。

解




11. 如右圖，長方形 $ABCD$ 中，甲、乙、丙皆為正方形，若乙的面積為 6，丙的面積為 2，則長方形 $ABCD$ 的面積為_____。

解



12. 如右圖， $ABCD$ 為長方形， $\overline{AB}=3$ ， $\overline{BC}=5$ 。今若將頂點 D 摺起與 $\overline{BC}$ 邊上的點 F 重合，則摺痕 $\overline{AE}$ 的長度為_____。

解





高中先修課程

銜接焦點 1

雙重根式的化簡

■ 已知 $a \geq b \geq 0$ ，則：

$$(1) \sqrt{(a+b)+2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}。$$

$$(2) \sqrt{(a+b)-2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}。$$

說明：

已知 $a \geq b \geq 0$ ，則：

$$(1) \sqrt{(a+b)+2\sqrt{ab}} = \sqrt{(\sqrt{a} + \sqrt{b})^2} = |\sqrt{a} + \sqrt{b}| = \sqrt{a} + \sqrt{b}。$$

$$(2) \sqrt{(a+b)-2\sqrt{ab}} = \sqrt{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2} = |\sqrt{a} - \sqrt{b}| = \sqrt{a} - \sqrt{b}。$$

例題 1

化簡下列雙重根式：

$$(1) \sqrt{3+2\sqrt{2}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

$$(2) \sqrt{3-2\sqrt{2}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

$$(3) \sqrt{11+4\sqrt{6}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

$$(4) \sqrt{14-\sqrt{96}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

解

練習 1

化簡下列雙重根式：

$$(1) \sqrt{4+2\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

$$(2) \sqrt{4-2\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

$$(3) \sqrt{18+6\sqrt{5}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

$$(4) \sqrt{14-\sqrt{180}} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

解



銜接焦點 2


算幾不等式

若 a, b 為非負實數，則有 $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ，當 $a=b$ 時，等號成立。

說明：

(1) $\frac{a+b}{2}$ 稱為 a 與 b 的算術平均數， $\sqrt{ab}$ 稱為 a 與 b 的幾何平均數。

(2) 考慮 $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \Rightarrow a+b-2\sqrt{ab} \geq 0 \Rightarrow \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ 。



例題 2

- (1) 已知 $x > 0, y > 0$ 且 $x+y=8$ ，則 xy 的最大值為_____。
- (2) 已知 $x > 0, y > 0$ 且 $xy=16$ ，則 $x+y$ 的最小值為_____。

解

練習 2

- (1) 已知 $x > 0, y > 0$ 且 $x+2y=8$ ，則 xy 的最大值為_____。
- (2) 已知 $x > 0, y > 0$ 且 $xy=27$ ，則 $3x+y$ 的最小值為_____。

解



先修銜接能力檢定

1. 化簡根式 $\frac{6}{\sqrt{7+\sqrt{40}}} =$ _____。

解

2. 化簡雙重根式 $\sqrt{6-\sqrt{20}} =$ _____。

解

3. 若 $\sqrt{14+4\sqrt{10}}$ 的整數部分為 a ，小數部分為 b ，則 $b =$ _____。


解

4. 若 $\sqrt{35-10\sqrt{10}}$ 的整數部分為 a ，小數部分為 b ，則 $b =$ _____。

解

5. 如右圖， $\angle C=90^\circ$ ， $\angle A=15^\circ$ ， $\angle BDC=30^\circ$ ，若 $\overline{BC}=1$ ，則 $\overline{AB}=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解



6. 已知 x, y 都是正數且 $xy=32$ ，則 x^2+y^2 的最小值為_____。

解

7. 有一長方形，其周長為 12，則此長方形的面積最大值為_____。

解

8. 有一長方形，其面積為 24，則此長方形的周長最小值為_____。

解



綜合能力檢定

1. 若 a 為正整數，且 $\sqrt{108} \leq \sqrt{a} < 15$ ，則滿足條件的 a 有 _____ 個。

解

2. 下列哪一個整數與 $\sqrt{2019 + \sqrt{108}}$ 最接近？


(A) 44 (B) 45 (C) 46 (D) 47。

答 _____。

解


3. 小英有一捆繩子，總長為 20 公尺，想在河邊圍出一個長方形菜園種香菜，河邊不必圍繩子，僅圍其餘三邊，則小英的菜園面積最大為 _____ 平方公尺。

解




4. 右圖是一個半圓， $\overline{AB}$ 為直徑，點 C 在 $\overline{AB}$ 上，點 D 在圓弧上，且 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ 。已知 $\overline{AC} = 3 + 2\sqrt{2}$ ， $\overline{BC} = 4$ ，則 $\overline{CD} =$ _____。

解



5. 如右圖， $\angle C = 90^\circ$ ， $\angle A = 22.5^\circ$ ， $\angle BDC = 45^\circ$ ，若 $\overline{BC} = 1$ ，則 $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ 的值為 _____。

解





數列與級數



國中複習

1. 數列

將一群數排成一列稱為數列，即 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ，其中 a_1 為首項， a_n 為末項，此數列共有 n 項。

2. 等差數列

有一個數列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ，若滿足

$a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3 = \dots = a_n - a_{n-1}$ (通常令此差距為 d ，稱為公差)，則稱數列為等差數列。

3. 等差數列的第 n 項

一等差數列的首項為 a_1 ，公差為 d ，則此數列的第 n 項 $a_n = a_1 + (n-1)d$ 。

4. 等差中項

若 a, b, c 三數依序成等差數列，則 $b = \frac{a+c}{2}$ 。

5. 級數

將一數列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 用加號「+」連結起來稱為級數，

即 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 。

6. 等差級數

將一等差數列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 用加號「+」連結起來稱為等差級數，

即 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 。

7. 等差級數的和

(1) 一個等差級數共有 n 項，首項為 a_1 ，公差為 d ，則此等差級數和為

$$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d]。$$

(2) 一個等差級數共有 n 項，首項為 a_1 ，末項為 a_n ，則此等差級數和為

$$S_n = \frac{n}{2} (a_1 + a_n)。$$

8. 等比數列

有一個數列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ ，若滿足 $\frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} = \dots = \frac{a_n}{a_{n-1}}$ (通常令此比值為 r ，稱為公比)，則稱數列為等比數列。

9. 等比中項

若 a, b, c 三數依序成等比數列，則 b 稱為 a, c 的等比中項且 $b = \pm\sqrt{ac}$ 。



國中基礎能力檢定

1. 等差數列 $\{a_n\}$ 如下：100，98，96，94，……，則此數列的第 36 項為_____。

解

2. 等差數列 $\{a_n\}$ ：-50，……，50，總共有 51 項，則此數列的公差為_____。

解

3. 如右圖，每一直行，每一橫列或任一對角線上的三數皆為等差數列，則 $b =$ _____。

解

a	b	c
d	9	e
3	f	-25

4. 等差數列 $\{a_n\}$ 共有 10 項，第 2 項 $a_2=12$ ，第 9 項 $a_9=-2$ ，則此數列的所有項的和為_____。

解

5. 等差數列 $\{a_n\}$ 首項為 -113 ，第 2 項為 -105 ，則此數列自第_____項開始為正數。

解

6. 有一直角三角形三邊長成等差數列，若此三角形周長為 24，則此三角形的面積為_____。

解

7. 下列哪些數列是等比數列？(多選)

(A) $1, 1, 1, 1, 1$

(B) $1, -1, 1, -1, 1$

(C) $-1, -1, 1, 1, -1$

(D) $\frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{20}, \frac{1}{40}, \frac{1}{80}$

(E) $\frac{1}{5}, \frac{1}{10}, \frac{1}{15}, \frac{1}{20}, \frac{1}{25}$ 。

答 _____。

解

8. 已知 $\alpha, 12, 9$ 三數依序成等比數列，則 $\alpha =$ _____。

解

9. 設 $\{a_n\}$ 是一個等比數列，且 $a_2 = 16, a_3 = -32$ ，則：

(1) 公比 $r =$ _____。

(2) 首項 $a_1 =$ _____。

(3) 數字 -2048 是此數列的第 _____ 項。

解

10. 籃球場的看臺觀眾席 D 區有 15 排座位，此區每一排都比其前一排多 1 個座位，阿哲坐在第 6 排，發現此排共有 20 個座位，則觀眾席 D 區總共有 _____ 個座位。



解

11. 有大小相同的球若干個，已知全部的球剛好可以排成一個每邊有 n 個球的正方形。若將全部的球改排成一個每邊 $n+2$ 個球的正三角形，也剛好用完所有的球。則可知全部的球有多少個？

(A) 36 個 (B) 64 個 (C) 100 個 (D) 144 個。

答 _____。

解



12. 有一天大寶意外救了國王，國王很高興，答應給大寶一個請求。大寶希望國王從今天起第一天給他 1 元，第二天給他 2 元，第三天給他 3 元，每天給的錢比前一天多 1 元，連續給 30 天。則大寶總共可以得到 _____ 元。

解



高中先修課程

銜接焦點 1

等比級數

■ 將一等比數列 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 用加號「+」連結起來稱為等比級數，即 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$ 。

(1) 一個等比級數共有 n 項，首項為 a_1 ，公比 $r \neq 1$ ，則此等比級數和為

$$S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}。$$

(2) 一個等比級數共有 n 項，首項為 a_1 ，公比為 $r=1$ ，則此等比級數和為 $S_n = na_1$ 。

說明：

(1) 公比 $r \neq 1$

$$S_n = a_1 + a_1r + a_1r^2 + \dots + a_1r^{n-2} + a_1r^{n-1} \dots\dots\dots ①$$

$$rS_n = a_1r + a_1r^2 + a_1r^3 + \dots + a_1r^{n-1} + a_1r^n \dots\dots\dots ②$$

$$\text{由①}-②\text{可得}(1-r)S_n = a_1 - a_1r^n \Rightarrow S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}。$$

$$\text{註：} S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1}。$$

(2) 公比 $r=1$ ，則 $S_n = a_1 + a_1 + a_1 + \dots + a_1 = na_1$ (每一項都是 a_1)。

例題 1

試求下列等比級數的和：

(1) $1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 128 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 (2) $2 - 4 + 8 - 16 + \dots + 128 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

練習 1

試求下列等比級數的和：

(1) $1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 243 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 (2) $3 - 9 + 27 - 81 + \dots + 243 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解



銜接焦點 2

級數和 $\sum_{k=1}^n a_k$

■ 級數和常以 Σ (唸 *sigma* 或 *summation*) 來表示, 即 $a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 。

說明 :

- (1) 數列的一般項為 a_k 。
- (2) k 之值由下標的 1 到上標 n , 依序表出 $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$, 再相加起來。

例題 2

- (1) 以 Σ 表示等差級數和 $1 + 2 + 3 + \cdots + 100 =$ _____。
- (2) 以 Σ 表示等差級數和 $1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + 99 =$ _____。
- (3) 以 Σ 表示等比級數和 $2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{10} =$ _____。

解

練習 2

- (1) 以 Σ 表示等差級數和 $2 + 4 + 6 + \cdots + 100 =$ _____。
- (2) 以 Σ 表示等比級數和 $3 + 3^2 + 3^3 + \cdots + 3^{10} =$ _____。

解



銜接焦點 3

單利、複利

■ 存款本金為 p ，每期利率為 r ，則：

- (1) 「單利」計息： n 期後的本利和為 $S_n = p(1 + nr)$ 。
- (2) 「複利」計息： n 期後的本利和為 $S_n = p(1 + r)^n$ 。

說明：

- (1) 所謂「單利」計息，即表示每一期皆以最初的本金 p 乘上利率 r 來得到利息，此利息是固定的 pr 。若以 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ 分別表示 1, 2, 3, $\dots, n$ 期後的本利和，則形成一個等差數列 $\langle S_n \rangle$ ，首項為 $S_1 = p + pr$ ，公差為 pr ，所以 n 期後的本利和 $S_n = p + pr \times n = p(1 + nr)$ 。
- (2) 所謂「複利」計息，即表示每一期皆以前一期的本利和當新的本金 S_{n-1} 乘上利率 r 來得到利息，此時 $S_n = S_{n-1} + S_{n-1} \times r$ ，即 $S_n = S_{n-1} \times (1 + r)$ 。則形成一個等比數列 $\langle S_n \rangle$ ，首項為 $S_1 = p(1 + r)$ ，公比為 $1 + r$ ，所以 n 期後的本利和 $S_n = p(1 + r)^n$ 。

例題 3

- (1) 第一年在銀行存入 10000 元，年利率為 5%，每年以單利計息一次，則三年後的本利和為 _____ 元。
- (2) 第一年在銀行存入 10000 元，年利率為 5%，每年以複利計息一次，則三年後的本利和為 _____ 元。(四捨五入取到整數位，已知 $(1.05)^3 = 1.157625$)

解

練習 3

- (1) 第一年在銀行存入 100000 元，年利率為 2%，每年以單利計息一次，則三年後的本利和為 _____ 元。
- (2) 第一年在銀行存入 100000 元，年利率為 2%，每年以複利計息一次，則三年後的本利和為 _____ 元。(四捨五入取到整數位，已知 $(1.02)^3 = 1.061208$)

解



先修銜接能力檢定

1. 若一等比級數的首項為 $a_1=3$ ，公比為 2，則其前 4 項的和為_____。

解

2. 若一等比級數的首項為 $a_1=3$ ，公比為 $-\frac{1}{2}$ ，則其前 4 項的和為_____。

解

3. 以 Σ 表示級數和 $(3+5\times 1)+(3^2+5\times 2)+(3^3+5\times 3)+\cdots+(3^{10}+5\times 10)=$

_____。

解

4. 等比級數 $2-\frac{2}{3}+\frac{2}{9}-\frac{2}{27}+\frac{2}{81}-\frac{2}{243}$ 的和為_____。

解

5. 第一年在銀行存入 10000 元，年利率為 10%，每年以複利計息一次，則三年後的本利和為_____元。

解

6. 每年年初在銀行存入 10000 元，連續三年的年利率為 10%，每年以複利計息一次，則第三年年底時，本利和共有_____元。

解

7. 小銘向銀行貸款 10 萬元，年利率為 10%，每年以複利計息一次，約定一年後開始，每年還款一次，分三年還清。則小銘每次平均應還銀行_____元。（四捨五入取到整數位）

解

8. 有一天二寶意外救了國王，國王很高興，答應給二寶一個請求。二寶希望國王從今天起第一天給他 1 元，第二天給他 2 元，第三天給他 4 元，每天給的錢是前一天的兩倍，連續給 30 天，則二寶總共可得到_____元。（已知 $2^{30}=1073741824$ ）

解



綜合能力檢定

1. 已知數列 $\{a_n\}$ 為一等差數列，若 $a_3=1$ ， $a_5=5$ ，則此數列的
- (1) 公差為_____。
(2) 首項為_____。
(3) 第 8 項 a_8 = _____。
(4) 前 6 項的總和為_____。

解

2. 已知數列 $\{a_n\}$ 為一等比數列且公比大於 0，若 $a_3=20$ ， $a_5=5$ ，則此數列的
- (1) 公比為_____。
(2) 首項為_____。
(3) 第 8 項 a_8 = _____。
(4) 前 6 項的總和為_____。

解


3. 級數和 $\sum_{k=1}^4 (3^k - 3k + 3)$ 之值為_____。

解

4. 某電影院共有 15 排座位，已知每一排均比前排多 2 個座位，若第 7 排有 30 個座位，則可知電影院總共有_____個座位。

解

5. 如右圖，有一邊長為 6 公分的正方形 S_1 ，若以 S_1 邊長的一半為邊長作一正方形 S_2 ，再以 S_2 邊長的一半為邊長再作一正方形 S_3 ，……，依此規律繼續操作，則 S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 的面積總和為_____平方公分。



解


單元 4

坐標與函數

國中複習

1. 數線

任意實數 a 都可以在數線上找到它對應的位置，如圖(一)。




圖(一)

2. 絕對值

若 x 為任意數，則 $|x|$ 表示 x 到原點的距離。

3. 數線上兩點距離


若數線上 $A(a)$, $B(b)$ ，則 A 、 B 兩點的距離為 $\overline{AB} = |a - b|$ ，如圖(二)。



圖(二)

4. 數線上中點公式

若數線上 $A(a)$, $B(b)$ ，則 $\overline{AB}$ 的中點坐標為 $\frac{a+b}{2}$ ，如圖(三)。



圖(三)

5. 平面直角坐標系


由兩條互相垂直的數線構成，平面上的所有點都有對應的坐標 (a, b) ，其中 a 稱為 x 坐標， b 稱為 y 坐標，如圖(四)。

6. 兩點距離


坐標平面上， $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 兩點的距離為 $\overline{AB} = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ ，如圖(五)。

7. 中點坐標


坐標平面上， $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ ，則 $\overline{AB}$ 的中點坐標為 $\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$ ，如圖(六)。



圖(四)



圖(五)



圖(六)

8. 函數的意義

對於每一個 x 值，都恰有一個 y 值與之對應，則稱 y 是 x 的函數，以符號 $y = f(x)$ 表示。其中稱 x 為自變數，稱 y 為應變數。



9. 函數圖形

設 $y = f(x)$ 是一個函數，則在直角坐標平面上，所有這樣的點 (x, y) 所構成的圖形，即為此函數 $y = f(x)$ 的圖形。

10. 線型函數圖形

若 a, b 為實數，則 $y=f(x)=ax+b$ 稱為線型函數。




- (1) 若 $a \neq 0$ ，則 $y=f(x)=ax+b$ 為一次函數，其圖形是一條斜直線，如圖(七)。
- (2) 若 $a=0$ ，則 $y=b$ 為常數函數，其圖形是一條水平線，如圖(八)。



11. 二次函數的圖形

設二次函數為 $y=a(x-h)^2+k$ ，則：

- (1) $a > 0$ ，圖形為開口向上的拋物線，頂點 (h, k) 為最低點，如圖(九)。
- (2) $a < 0$ ，圖形為開口向下的拋物線，頂點 (h, k) 為最高點，如圖(十)。
- (3) $|a|$ 值愈大，則拋物線的開口愈小；
 $|a|$ 值愈小，則拋物線的開口愈大，如圖(十一)。



12. 二次函數的最大值與最小值



設二次函數為 $y=a(x-h)^2+k$ ，

- (1) $a > 0$ ，拋物線的開口向上，則在 $x=h$ 時， y 有最小值 k 。
- (2) $a < 0$ ，拋物線的開口向下，則在 $x=h$ 時， y 有最大值 k 。

13. 二次函數的圖形的平移

已知 $h > 0, k > 0$

- (1) 右移 h 單位： $y=ax^2 \Rightarrow y=a(x-h)^2$ 。
- (2) 左移 h 單位： $y=ax^2 \Rightarrow y=a(x+h)^2$ 。
- (3) 上移 k 單位： $y=ax^2 \Rightarrow y=ax^2+k$ 。
- (4) 下移 k 單位： $y=ax^2 \Rightarrow y=ax^2-k$ 。
- (5) 不論左右或上下平移，開口方向及大小都沒有改變，但是頂點位置可能會改變。





國中基礎能力檢定

1. 已知一次函數 $f(x) = 3x - 1$ ，則 $f(1) + f(2) + f(-3) =$ _____。

解


2. 已知 $a < 0$ ， $b > 0$ ，則直線 $y = ax + b$ 圖形不通過下列哪一個象限？
(A)第一象限 (B)第二象限 (C)第三象限 (D)第四象限。

答 _____。

解

3. 如右圖，直線 L 為線型函數 $f(x) = ax + b$ ，則 $f(0) =$ _____。

解



4. 若 $y=ax+b$ 的圖形是一條通過點 $(-4, 3)$ 的水平直線，則數對 $(a, b) =$ _____。

解

5. 直角坐標平面原點 $O(0, 0)$ 到直線 $L: 3x+4y-12=0$ 上的所有點的距離之中，最小距離為

_____。

解

6. 已知二次函數 $y=a(x-h)^2+k$ 的頂點為 $(1, 2)$ ，且通過點 $(3, 4)$ ，則此二次函數為

_____。

解

7. 已知 $f(x) = -2(x-3.3)^2 + 4$ ，則下列的函數值之中哪一個最大？

(A) $f(2)$ (B) $f(3)$ (C) $f(4)$ (D) $f(5)$ 。

答 _____。

解

8. 已知 $f(x) = 2(x-3.3)^2 - 4$ ，則下列的函數值哪一個最大？

(A) $f(2)$ (B) $f(3)$ (C) $f(4)$ (D) $f(5)$ 。

答 _____。

解

9. 二次函數 $y = x^2 + 9x - 36$ 的圖形與 x 軸交於相異兩點 A 、 B ，則 $\overline{AB}$ 的長度為_____。

解

10. 已知 $k > 0$ ，若二次函數 $y = x^2 + 3$ 向右平移 k 單位可通過點 $(0, 7)$ ，則 k 之值為_____。


解

11. 已知由地面算起每爬升 100 公尺，氣溫就下降 0.6 度。若現在地面溫度是 20 度，阿雄在高度為 3600 公尺的山上健行，則他所在位置的氣溫應該是_____度。

解

12. 如右圖是二次函數 $y = 2x^2 + bx + c$ 的圖形，則數對 (b, c) = _____。

解






高中先修課程

銜接焦點 1

分點公式

數線上有相異兩點 $A(a)$, $B(b)$, 若點 P 是 $\overline{AB}$ 上的分點, 且滿足

$\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$, 其中 m, n 皆為正實數, 則點 P 的坐標為 $\frac{na+mb}{m+n}$ 。



說明


(1) 假設 $a < b$, 令 $P(x)$, 由 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$

$$\Rightarrow (x-a) : (b-x) = m : n \Rightarrow n(x-a) = m(b-x)$$

$$\Rightarrow (m+n)x = na+mb \Rightarrow x = \frac{na+mb}{m+n}。$$

(2) 平面上有相異兩點 $A(x_1, y_1)$ 與 $B(x_2, y_2)$, 若點 P 為 $\overline{AB}$ 上的分點, 使得 $\overline{AP} : \overline{PB} = m : n$, 分別討論 x 坐標及 y 坐標的分

點公式, 則可得到點 P 的坐標為 $\left(\frac{nx_1+mx_2}{m+n}, \frac{ny_1+my_2}{m+n} \right)$ 。



例題 1

- 數線上兩點 $A(-3)$, $B(11)$, 若點 $P(x)$ 在 $\overline{AB}$ 上, 且 $\overline{AP} : \overline{PB} = 5 : 2$, 則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 坐標平面上 $A(1, -3)$, $B(11, 12)$, 若點 P 在 $\overline{AB}$ 上, 且滿足 $\overline{AP} : \overline{PB} = 2 : 3$, 則點 P 的坐標為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

練習 1

- 數線上兩點 $A(3)$, $B(-9)$, 若點 $Q(x)$ 在 $\overline{AB}$ 上, 且 $\overline{AQ} : \overline{QB} = 2 : 1$, 則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 坐標平面上 $A(-3, 2)$, $B(4, 9)$, 若點 Q 在 $\overline{AB}$ 上, 且滿足 $\overline{AQ} : \overline{QB} = 4 : 3$, 則點 Q 的坐標為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解



銜接焦點 2

二次函數與配方法

■ 將二次函數 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 整理成 $f(x) = a(x-h)^2 + k$ 的型式，即是對二次函數配方，如此可知二次函數 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 的頂點為 (h, k) ，對稱軸為 $x = h$ 。

說明

(1) 使用配方法的步驟如下：

- ① x^2 項及 x 項提出係數 a ，使得 x^2 項的係數為 1。
- ② x^2 項及 x 項配成完全平方。
- ③ 調整常數項。

(2) $f(x) = ax^2 + bx + c$

$$\begin{aligned}
 &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\
 &= a \left[x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a} \cdot x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right] + c - a \cdot \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \\
 &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}。
 \end{aligned}$$

例題 2

- (1) 二次函數 $f(x) = x^2 + 4x + 3$ 的頂點為_____。
- (2) 二次函數 $f(x) = -x^2 + 2x + 5$ 的頂點為_____。
- (3) 二次函數 $f(x) = 3x^2 - 18x - 27$ 的頂點為_____。

解

練習 2

- (1) 二次函數 $f(x) = x^2 - 4x + 9$ 的頂點為_____。
- (2) 二次函數 $f(x) = -x^2 - 2x + 5$ 的頂點為_____。
- (3) 二次函數 $f(x) = -2x^2 - 2x - 2$ 的頂點為_____。

解



先修銜接能力檢定

1. 數線上兩點 $A(-5)$ ， $B(15)$ ，若點 $P(x)$ 在 $\overline{AB}$ 上，且 $\overline{AP} : \overline{PB} = 2 : 3$ ，則 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

2. 數線上 $A(a)$ ， $B(18)$ ，若點 $M(-1)$ 是 $\overline{AB}$ 的中點，則 a 之值為 。

解

3. 坐標平面上 $A(1, -2)$ ， $B(13, 16)$ ，若點 Q 在 $\overline{AB}$ 上，且滿足 $\overline{AQ} : \overline{QB} = 1 : 5$ ，則點 Q 的坐標為 。

解

4. 坐標平面上 $A(a, -5)$ ， $B(3, b)$ ，若點 $Q(-1, 2)$ 是 $\overline{AB}$ 的中點，則數對 (a, b) = 。

解

5. 試求下列各小題中的實數數對 (p, q) ：

(1) $x^2 + 4x + 3 = (x - p)^2 + q$ ，則數對 $(p, q) =$ _____。

(2) $-x^2 + x - 2 = -(x - p)^2 + q$ ，則數對 $(p, q) =$ _____。

(3) $2x^2 + 6x - 3 = 2(x - p)^2 + q$ ，則數對 $(p, q) =$ _____。

(4) $-3x^2 + x + 2 = -3(x - p)^2 + q$ ，則數對 $(p, q) =$ _____。

解

6. 已知 $f(x) = 2x^2 - 8x + m$ 的最小值為 160，則 $m =$ _____。


解

7. 將二次函數 $y = x^2 + 6x + 3$ 的圖形上移 k 單位，新圖形與 x 軸恰交於一點，則 k 之值為 _____。

解

8. 小明想用 60 公尺的鐵絲網在河邊圍成一長方形的菜圃，河邊可當一邊不用鐵絲網，僅圍其餘三邊。則小明可圍成的長方形菜圃的最大面積為 _____ 平方公尺。

解





綜合能力檢定

1. 潛水夫在水面下的深度(d 公尺)與身體所承受壓力(p 個大氣壓)有下列關係 $p=k \times d+1$ (其中 k 為常數)，若在水面下 50 公尺，身體所承受的壓力為 5.97 個大氣壓，則在水面下 100 公尺，身體所承受的壓力為_____個大氣壓。

解

2. 二次函數 $f(x)=(x-2)^2+x^2+(x+5)^2$ 的最小值為_____。

解

3. 坐標平面上 $A(1, 2)$ ， $B(9, -6)$ ，若點 P 在 $\overline{AB}$ 上，且滿足 $\overline{AP}:\overline{PB}=5:3$ ，則點 P 的坐標為_____。

解

4. 若二次函數 $f(x) = 2x^2 + 4x + k$ 的圖形和 x 軸沒有交點，則實數 k 可能為下列何者？(多選)
(A) -6 (B) -3 (C) 0 (D) 3 (E) 6 。

答 _____。

解

5. 設 p, q, r 皆為介於 2 與 10 之間的實數，且滿足


$$\sqrt{6}|p-2| = \sqrt{7}|p-10|, \sqrt{7}|q-2| = \sqrt{8}|q-10|, \sqrt{5}|r-2| = \sqrt{6}|r-10|,$$

請比較 p, q, r 的大小，下列選項何者正確？

- (A) $p > q > r$ (B) $q > r > p$ (C) $q > p > r$ (D) $r > p > q$ 。


答 _____。

解



國中複習

- 三角形的內角和為 180° 。
 - 正三角形的每一內角為 60° 。
 - 外角定理：如右圖， $\theta = \theta_1 + \theta_2$ 。



- 正 n 邊形的內角和為 $(n-2) \times 180^\circ$ 。
 - 正 n 邊形的任一內角為 $\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$ 。

3. 三角形的邊角關係


在同一個三角形中：

- 任意兩邊和大於第三邊，任意兩邊差小於第三邊。
- 大角對大邊，小角對小邊。

4. 三角形的全等

若 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，

則兩個三角形的對應角相等且對應邊相等。




5. SSA

已知兩三角形 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ ，

$\angle A = \angle D$ 且 $\overline{AB} = \overline{DE}$ ， $\overline{BC} = \overline{EF}$ ，


則兩個三角形可能全等也可能不全等。



6. 三角形的相似

若 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ，


則兩個三角形的對應角相等且對應邊成比例。



7. 直角三角形的畢氏定理


若直角三角形的斜邊長為 c ，兩股長分別為 a ， b ，

則 $c^2 = a^2 + b^2$ 。




8. 直角三角形斜邊上的高

如右圖，斜邊上的高 $h = \frac{ab}{c}$ 。




9. 直角三角形母子相似定理

在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ ，
則 $\overline{CD}^2 = \overline{AD} \times \overline{BD}$ 。




10. 內分比性質

在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AD}$ 平分 $\angle BAC$ ，
則 $\overline{BA} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}$ 。




11. 平行線截三角形兩邊成比例線段性質

如右圖，若 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ ，則 $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ 。




12. 三角形的心


- (1) 重心，如圖(一)：三中線的交點。
- (2) 外心，如圖(二)：三邊中垂線的交點。
- (3) 垂心，如圖(三)：三邊上高的交點。
- (4) 內心，如圖(四)：三內角平分線的交點。




圖(一)



圖(二)




圖(三)




圖(四)

13. 圓外切四邊形

如圖(五)，若 $ABCD$ 為圓外切四邊形，
則 $\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$ 。




圖(五)




圖(六)

14. 圓內接四邊形對角互補

如圖(六)， $\angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$ ， $\angle 2 + \angle 4 = 180^\circ$ 。



圖(七)




圖(八)


15. (1) 對同弧圓周角相等，如圖(七)， $\angle 1 = \angle 2 = \angle 3$ 。

- (2) 對同弧圓心角是圓周角的兩倍，如圖(八)，
 $\angle 1 = 2\angle 2$ 。

16. 如圖(九)，弦切角等於截弧所對圓周角 $\Rightarrow \angle 1 = \angle 2$ 。





17. 如圖(十)，半圓內圓周角為 90° 。



18. 特殊立體圖形


- (1) 正四面體，如圖(十一)。
- (2) 正六面體，如圖(十二)。



19. 三角比

銳角的正弦、餘弦、正切

- (1) $\sin \theta = \frac{a}{c}$ $\left(\frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}} \right)$ 。
- (2) $\cos \theta = \frac{b}{c}$ $\left(\frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}} \right)$ 。
- (3) $\tan \theta = \frac{a}{b}$ $\left(\frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} \right)$ 。






國中基礎能力檢定


1. 如右圖，正五邊形與正六邊形有共同邊 $\overline{AB}$ ，則 $\angle CAD$ 的度數為 _____ 度。

解



2. 如右圖，角度 $\theta =$ _____ 度。

解




3. 已知 x 是正整數，若 16, 9, $x-5$ 表三角形的三邊長，則滿足此條件的 x 值有 _____ 個。

解


4. 如右圖， $\overline{OE} =$ _____。

解



5. 如右圖，以直角三角形的三邊為邊長向外作正方形，若正方形 $ABED$ 、 $BFGC$ 的面積分別為 36、64，則正方形 $ACHI$ 的面積為 _____。

解




6. 如右圖， $\overline{AB}=9$ ， $\overline{BC}=11$ ， $\overline{AC}=12$ ， $\overline{AD}=6$ ， $\overline{AE}=8$ ，則：

(1) $\overline{DE} =$ _____。


(2) $\triangle ADE$ 面積與 $\triangle ABC$ 面積的比值為 _____。

解




7. 如右圖， $\overline{AB}$ 為直徑，點 C 在 $\overline{AB}$ 上，點 D 在圓弧上，且 $\overline{AC}=8$ ， $\overline{BC}=3$ ，若 $\overline{CD} \perp \overline{AB}$ ，則 $\overline{CD} =$ _____。

解



8. 如右圖， O 為圓心，則 $\angle 2$ 為 _____ 度。


解



9. 如右圖， $\triangle ABC$ 三邊長依序為 5，6，7，且知 $\angle 1 = \angle 2$ ，


則 $\overline{BD} =$ _____。

解



10. 如右圖， $\overline{CD} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解




11. 如右圖，

(1) $\sin A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 (2) $\cos A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 (3) $\tan A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) $\sin B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 (5) $\cos B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。 (6) $\tan B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解




12. 如右圖， $OABCPQRS$ 為一長方體， $\overline{OA} = 2$ ， $\overline{OC} = 3$ ， $\overline{OP} = 4$ ，

(1) 一隻蜜蜂由點 O 飛到點 R ，其最短路徑長為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 一隻螞蟻由點 O 爬到點 R ，其最短路徑長為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解








高中先修課程



銜接焦點 1

直角三角形

1. 特別角







2. 畢氏三元組

已知 m, n 為兩正整數且 $m > n$ ，則 $m^2 - n^2, m^2 + n^2, 2mn$ 可為一個直角三角形的三邊長。

說明：


- (1) 因為 $(m^2 + n^2)^2 = (m^2 - n^2)^2 + (2mn)^2$ ，
所以可形成直角三角形，如右圖所示。
- (2) 其它常見的直角三角形



例題 1

- (1) 如右圖， $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (2) 依畢氏三元組，給定 $m = 6, n = 3$ ，可得直角三角形三邊長為
 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。


解



練習 1

- (1) 如右圖， $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (2) 依畢氏三元組，給定 $m=5$ ， $n=1$ ，可得直角三角形三邊長為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解



銜接焦點 2

三角比的關係

■ 已知 θ 為銳角(1) 平方關係： $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 。(2) 商數關係： $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 。(3) 餘角關係：① $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$ 。② $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$ 。

說明：


(1) 如圖(一)，畢氏定理 $c^2 = a^2 + b^2$ ，

$$\text{則 } \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} = 1。$$


(2) 如圖(一)， $\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{c}} = \frac{a}{b} = \tan \theta$ 。

(3) 如圖(二)，① $\sin(90^\circ - \theta) = \frac{b}{c} = \cos \theta$ 。

② $\cos(90^\circ - \theta) = \frac{a}{c} = \sin \theta$ 。



圖(一)



圖(二)

例題 2

- (1) $\sin^2 23^\circ + \sin^2 37^\circ + \cos^2 23^\circ + \cos^2 37^\circ = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (2) 已知 θ 為銳角且 $2 \sin \theta = 3 \cos \theta$ ，則 $\tan \theta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (3) 下列哪一選項的值與 $\sin 23^\circ$ 相同？
 (A) $\cos 23^\circ$ (B) $\sin 67^\circ$ (C) $\cos 67^\circ$ (D) $\tan 67^\circ$ 。

答 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。**解****練習 2**

- (1) 若 $\sin \theta = \frac{1}{3}$ ，則 $1 - \cos^2 \theta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (2) 已知 θ 為銳角且 $3 \cos \theta - \sin \theta = 0$ ，則 $\tan \theta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- (3) 下列哪一個選項的值與 $\cos 37^\circ$ 相同？
 (A) $\sin 37^\circ$ (B) $\sin 53^\circ$ (C) $\cos 53^\circ$ (D) $\tan 53^\circ$ 。


答 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。**解**



先修銜接能力檢定

1. 如右圖，正方形的面積為_____。

解




2. 如右圖，

(1) $\sin 60^\circ =$ _____。

(2) $\cos 60^\circ =$ _____。

(3) $\tan 60^\circ =$ _____。

解




3. 如右圖，

(1) $x =$ _____。

(2) $\sin A =$ _____。


(3) $\tan A =$ _____。

解




4. 如右圖，已知 $\tan 40^\circ \approx 0.8391$ ，則 $h \approx$ _____。(四捨五入取到小數點後第二位)

解



5. 如右圖，小明的身高 180 公分，前方有一座垂直路面的路燈，當他站在離路燈底座 7 公尺處，發現自己影長為 3 公尺，試問路燈的高度是_____公尺。

解



6. 已知 θ 為銳角，若 $\cos \theta = t$ ，則 $\sin \theta =$ _____。(以 t 表示)

解

7. 已知 θ 為銳角且 $\frac{\cos \theta + 2 \sin \theta}{\cos \theta - 2 \sin \theta} = 11$ ，則 $\tan \theta =$ _____。

解

8. 試求 $\sin^2 15^\circ + \sin^2 25^\circ + \sin^2 45^\circ + \sin^2 65^\circ + \sin^2 75^\circ$ 之值為_____。


解



綜合能力檢定


1. 如右圖，試求出 $\tan 15^\circ =$ _____。

解




2. 如右圖，圓內接三角形 ABC ， $\overline{AB}=6$ ， $\angle ACB=30^\circ$ ，則此外接圓的半徑為_____。

解



3. 如右圖，分別以直角三角形三邊長為直徑作出三個半圓，則鋪色部分的面積為_____。

解




4. 已知 θ 為銳角且 $2 \sin \theta - \cos \theta - 1 = 0$ ，則 $\sin \theta$ 之值為 _____。

解


5. 如右圖，一根木棍 $\overline{AB}$ 原本倚靠牆上，在地面上滑動了 30 公分成為 $\overline{A'B'}$ ，則此木棍的長度為 _____ 公分。

解






立體圖與三視圖




生活周遭有許多物品，建築物，藝術品，當我們從不同的角度觀看時，所看到的形狀，就成為「視圖」。一般立體圖形通常會由六個不同方向(前、後、左、右、上、下)去觀察此立體圖形的視圖，其中右視圖與左視圖、前視圖與後視圖，上視圖與下視圖兩形狀相同，僅方向相反，因此，一般情況下我們僅挑選右視圖、前視圖、上視圖(俯視圖)三個視圖即可清楚地表達一個立體圖形，稱為「三視圖」。

影片解說：<https://www.youtube.com/watch?v=CwQg6DS8fKg>




例題 1


試在方格中繪出下方立體圖形的三視圖。




解



前視圖




右視圖




俯視圖

練習 1


試在方格中繪出下方立體圖形的三視圖。




解



前視圖







右視圖



俯視圖

例題 2





下列哪一個選項是此物體的俯視圖？



解 _____。

練習 2

下列哪一個選項是此物體的俯視圖？



解 _____。

解答篇

單元 1 乘法公式

★ 國中基礎能力檢定

P.4

簡答

1. -4080 2. 7760 3. 64 4. 625 5. -1
6. 88 7. 12 8. 0 9. 7 10. (A) 11. (B) 12. (C)

詳解

- $$\begin{aligned} & (-15) \times (-16) \times (-17) \\ &= -(15 \times 16 \times 17) \\ &= -4080 \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} & (88.8)^2 - (11.2)^2 = (88.8 + 11.2) \times (88.8 - 11.2) \\ &= 100 \times 77.6 \\ &= 7760 \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} & (3 - \sqrt{5})^3 (3 + \sqrt{5})^3 = [(3 + \sqrt{5}) \times (3 - \sqrt{5})]^3 \\ &= [3^2 - (\sqrt{5})^2]^3 \\ &= 4^3 \\ &= 64 \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} & 108 \times 25^3 - 2699 \times 25^2 \\ &= 25^2 \times (108 \times 25 - 2699) \\ &= 625 \times (2700 - 2699) \\ &= 625 \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} & \frac{2019^2 - 2 \times 2019 + 1}{2018} - \frac{108^2 + 2 \times 108 \times 1911 + 1911^2}{2019} \\ &= \frac{(2019 - 1)^2}{2018} - \frac{(108 + 1911)^2}{2019} \\ &= \frac{2018^2}{2018} - \frac{2019^2}{2019} \\ &= 2018 - 2019 = -1 \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} & a^2 + b^2 = (a - b)^2 + 2ab \\ &= 10^2 + 2 \times (-6) \\ &= 100 - 12 \\ &= 88 \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} & \frac{\beta + 1}{\alpha} + \frac{\alpha + 1}{\beta} = \frac{\beta^2 + \beta + \alpha^2 + \alpha}{\alpha\beta} \\ &= \frac{[(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta] + (\alpha + \beta)}{\alpha\beta} \\ &= \frac{(6^2 - 2 \times 3) + 6}{3} \\ &= 12 \end{aligned}$$

- $$\begin{aligned} & (a^2 + 2a + 1) + \left(b^2 + b + \frac{1}{4}\right) + \left(c^2 - c + \frac{1}{4}\right) \\ &+ (d^2 - 2d + 1) = 0 \\ &\Rightarrow (a + 1)^2 + \left(b + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(c - \frac{1}{2}\right)^2 + (d - 1)^2 = 0 \\ &\because a, b, c, d \text{ 為實數} \\ &\therefore a + 1 = 0, \text{ 且 } b + \frac{1}{2} = 0, \text{ 且 } c - \frac{1}{2} = 0, \\ &\quad \text{且 } d - 1 = 0 \\ &\text{得 } a = -1, b = -\frac{1}{2}, c = \frac{1}{2}, d = 1 \\ &\text{所求 } a + b + c + d = (-1) + \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} + 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} & x^2 - 3x + 1 = 0 \Rightarrow x - 3 + \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow x + \frac{1}{x} = 3 \\ &\text{所求 } x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 3^2 - 2 = 7 \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} & \text{利用平方差公式 } (a - b)(a + b) = a^2 - b^2 \\ & A = (3^2 - 1)(3^2 + 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1) \\ &= (3^4 - 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1) \\ &= (3^8 - 1)(3^8 + 1)(3^{16} + 1) \\ &= (3^{16} - 1)(3^{16} + 1) = 3^{32} - 1 \\ &\text{檢查 } 3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 27, 3^4 = 81, \\ &\quad 3^5 = 243, \dots\dots \\ &\text{可知 } 3^n \text{ 的個位數依 } \underline{3, 9, 7, 1}, \underline{3, 9, 7, 1}, \dots\dots \text{循環} \\ &\text{則 } 3^{32} \text{ 的個位數為 } 1 \\ &\text{即 } A = 3^{32} - 1 \text{ 的個位數字為 } 0 \\ &\text{故選(A)} \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} & \text{鋪色部分面積為 } (a + b)^2 - \frac{ab}{2} \times 4 = a^2 + b^2 \\ &\text{故選(B)} \end{aligned}$$
- $$\begin{aligned} & \text{所求為 } \frac{2.5 \text{ 微米}}{50 \text{ 奈米}} = \frac{2.5 \times 10^{-6} \text{ 公尺}}{50 \times 10^{-9} \text{ 公尺}} \\ &= \frac{2500 \times 10^{-9} \text{ 公尺}}{50 \times 10^{-9} \text{ 公尺}} \\ &= 50 (\text{倍}) \\ &\text{故選(C)} \end{aligned}$$

* 高中先修課程

P.7

例題 1

$$\begin{aligned}
 (1) \quad a^2 + b^2 &= (a+b)^2 - 2ab \\
 &= 5^2 - 2 \times (-3) \\
 &= 31 \\
 (2) \quad a^3 + b^3 &= (a+b)^3 - 3ab(a+b) \\
 &= 5^3 - 3 \times (-3) \times 5 \\
 &= 170
 \end{aligned}$$

練習 1

$$\begin{aligned}
 (1) \quad a^2 + b^2 &= (a-b)^2 + 2ab \\
 &= 3^2 + 2 \times 1 \\
 &= 11 \\
 (2) \quad a^3 - b^3 &= (a-b)^3 + 3ab(a-b) \\
 &= 3^3 + 3 \times 1 \times 3 \\
 &= 36
 \end{aligned}$$

例題 2

$$\begin{aligned}
 (1) \quad x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \\
 &= 3^2 - 2 \\
 &= 7 \\
 (2) \quad x^3 + \frac{1}{x^3} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) \\
 &= 3^3 - 3 \times 3 \\
 &= 18
 \end{aligned}$$

練習 2

$$\begin{aligned}
 (1) \quad x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2 \\
 &= 5^2 + 2 = 27 \\
 (2) \quad x^3 - \frac{1}{x^3} &= \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + 3\left(x - \frac{1}{x}\right) \\
 &= 5^3 + 3 \times 5 \\
 &= 140
 \end{aligned}$$

先修銜接能力檢定

P.9

簡答

1. 970300 2. 510 3. 18 4. 123 5. 18
6. 1023 7. 665 8. (D)

詳解

$$\begin{aligned}
 1. \quad a^3 + b^3 &= (a+b)^3 - 3ab(a+b) \\
 &= (99+1)^3 - 3 \times 99 \times 1 \times (99+1) \\
 &= 100^3 - 3 \times 99 \times 100 \\
 &= 970300 \\
 2. \quad a^4 b - ab^4 &= ab(a^3 - b^3) \\
 &= ab[(a-b)^3 + 3ab(a-b)] \\
 &= 3 \times (5^3 + 3 \times 3 \times 5) \\
 &= 510
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \frac{b^2}{a} + \frac{a^2}{b} &= \frac{b^3 + a^3}{ab} \\
 &= \frac{(a+b)^3 - 3ab(a+b)}{ab} \\
 &= \frac{3^3 - 3 \times 1 \times 3}{1} \\
 &= 18
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \quad x^2 + \frac{1}{x^2} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \\
 &= 3^2 - 2 = 7 \\
 x^3 + \frac{1}{x^3} &= \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3\left(x + \frac{1}{x}\right) \\
 &= 3^3 - 3 \times 3 = 18
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{所求 } x^5 + \frac{1}{x^5} &= \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right) \\
 &= 7 \times 18 - 3 \\
 &= 123
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad a^6 + \frac{1}{a^6} &= \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right)^3 - 3 \times a^2 \times \frac{1}{a^2} \times \left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right) \\
 &= 3^3 - 3 \times 1 \times 3 = 18
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. \quad \text{令 } A &= 2^9 + 2^8 + 2^7 + \cdots + 2 + 1 \\
 &\Rightarrow (2-1)A = (2-1) \times (2^9 + 2^8 + 2^7 + \cdots + 2 + 1) \\
 &= 2^{10} - 1 \\
 &\Rightarrow A = 2^{10} - 1 = 1024 - 1 = 1023
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. \quad \text{令 } A &= 3^5 + 3^4 \times 2 + 3^3 \times 2^2 + 3^2 \times 2^3 + 3 \times 2^4 + 2^5 \\
 &\Rightarrow (3-2)A \\
 &= (3-2) \times (3^5 + 3^4 \times 2 + 3^3 \times 2^2 + 3^2 \times 2^3 + 3 \times 2^4 + 2^5) \\
 &= 3^6 - 2^6 \\
 &= 729 - 64 \\
 &= 665 \\
 &\Rightarrow A = 665
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 8. \quad \text{依題意 } ((b^2)^2)^2 &= 81^4 \\
 &\Rightarrow b^8 = (3^4)^4 \\
 &\Rightarrow b^8 = (3^2)^8 \\
 \text{得 } b &= 3^2 = 9 \\
 \text{故選(D)}
 \end{aligned}$$

綜合能力檢定

P.11

簡答

1. (D) 2. $\frac{5}{2}$ 3. 40 4. (A) 5. 略

詳解

$$\begin{aligned}
 1. \quad (99.8)^2 &= (100 - 0.2)^2 \\
 &= 100^2 - 2 \times 100 \times 0.2 + (0.2)^2 \\
 &= 9960.04 \\
 \text{故選(D)}
 \end{aligned}$$

2. 公式 $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$

$$\Rightarrow 1^2 = 2 + 2ab$$

$$\Rightarrow ab = -\frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{所求 } a^3 + b^3 &= (a+b)^3 - 3ab(a+b) \\ &= 1^3 - 3 \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times 1 = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

3. 依題意 $a^2 - 4a + 2 = 0$

$$\Rightarrow a - 4 + \frac{2}{a} = 0 \Rightarrow a + \frac{2}{a} = 4$$

$$\begin{aligned} \text{所求 } a^3 + \frac{8}{a^3} &= \left(a + \frac{2}{a}\right)^3 - 3 \times a \times \frac{2}{a} \times \left(a + \frac{2}{a}\right) \\ &= 4^3 - 3 \times 2 \times 4 \\ &= 40 \end{aligned}$$

4. $a - c = (a - b) + (b - c)$

$$= (2 + \sqrt{2}) + (2 - \sqrt{2}) = 4$$

所求 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$

$$= \frac{1}{2}(2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca)$$

$$= \frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2]$$

$$= \frac{1}{2}[(2+\sqrt{2})^2 + (2-\sqrt{2})^2 + 4^2]$$

$$= 14$$

故選(A)

5. $\alpha^n - \beta^n = 0$

$$\begin{aligned} \Rightarrow (\alpha - \beta) \times (\alpha^{n-1} + \alpha^{n-2}\beta + \alpha^{n-3}\beta^2 + \cdots \\ + \alpha\beta^{n-2} + \beta^{n-1}) = 0 \end{aligned}$$

$$\because \alpha > 0 \text{ 且 } \beta > 0$$

$$\therefore \alpha^{n-1} + \alpha^{n-2}\beta + \cdots + \alpha\beta^{n-2} + \beta^{n-1} > 0 \text{ 恆成立}$$

$$\text{可得 } \alpha - \beta = 0$$

$$\text{即 } \alpha = \beta$$

單元 2

根式運算



國中基礎能力檢定

P.15

簡答

1. 6 2. $2\sqrt{3}$ 3. 720 4. (D) 5. 10 6. 3
7. (A) 8. $\sqrt{2} + 2$ 9. (C) 10. (D) 11. $14 + 6\sqrt{3}$
12. $\frac{5\sqrt{10}}{3}$

詳解

1. 依題意 $x^2 - 12x + 45 = (\pm 3)^2$

$$\Rightarrow x^2 - 12x + 36 = 0$$

$$\Rightarrow (x-6)^2 = 0$$

$$\Rightarrow x = 6$$

2. $4\sqrt{12} + 2\sqrt{27} - 3\sqrt{48}$

$$= 4(2\sqrt{3}) + 2(3\sqrt{3}) - 3(4\sqrt{3})$$

$$= 8\sqrt{3} + 6\sqrt{3} - 12\sqrt{3}$$

$$= 2\sqrt{3}$$

3. $\sqrt{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{4} \times \sqrt{5} \times \sqrt{6} \times \sqrt{8} \times \sqrt{9} \times \sqrt{10}$

$$= \sqrt{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 8 \times 9 \times 10}$$

$$= \sqrt{2^8 \times 3^4 \times 5^2}$$

$$= 2^4 \times 3^2 \times 5$$

$$= 720$$

4. $a = 2\sqrt{6} = \sqrt{24}$

$$b = 3\sqrt{3} = \sqrt{27}$$

$$c = 4\sqrt{2} = \sqrt{32}$$

$$\Rightarrow c > b > a$$

故選(D)

5. $\sqrt{108-n}$ 為正整數

$$\text{則 } 108-n \text{ 可以是 } 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, \dots, 10^2,$$

總共 10 種情形

故符合條件的 n 有 10 個

6. $\sqrt{108 \times n} = \sqrt{2^2 \times 3^3 \times n}$

故使得 $\sqrt{108 \times n}$ 為正整數的最小 n 值為 3

7. 已知 $-3 < a < 1$

$$\text{所求 } \sqrt{(a-1)^2} + \sqrt{(a+3)^2}$$

$$= |a-1| + |a+3|$$

$$= (1-a) + (a+3)$$

$$= 4$$

故選(A)

8. $\frac{2}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2-\sqrt{2}} + \frac{1}{2+\sqrt{2}}$

$$= \frac{2 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} + \frac{2+\sqrt{2}}{(2-\sqrt{2}) \times (2+\sqrt{2})}$$

$$+ \frac{2-\sqrt{2}}{(2+\sqrt{2}) \times (2-\sqrt{2})}$$

$$= \frac{2\sqrt{2}}{2} + \frac{2+\sqrt{2}}{2} + \frac{2-\sqrt{2}}{2}$$

$$= \sqrt{2} + 2$$

9. 可得 $\overline{OP} = \overline{OB} = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}$

則 P 之坐標為 $2\sqrt{10}$

故選(C)

10. 螢幕寬度為 $\sqrt{6.1^2 - 5^2} = \sqrt{12.21} \approx 3.5$ (吋)

故選(D)

11. 乙之邊長為 $\sqrt{6}$ ，丙之邊長為 $\sqrt{2}$

$$\text{得 } \begin{cases} \overline{AD} = \sqrt{6} + \sqrt{2} \\ \overline{CD} = 2\sqrt{6} + \sqrt{2} \end{cases}$$

故長方形 $ABCD$ 面積為

$$(\sqrt{6} + \sqrt{2}) \times (2\sqrt{6} + \sqrt{2}) = 14 + 6\sqrt{3}$$

12. 設 $\overline{DE} = \overline{EF} = x$

$$\begin{aligned}\text{在 } \triangle ABF \text{ 中, } \overline{BF} &= \sqrt{\overline{AF}^2 - \overline{AB}^2} \\ &= \sqrt{5^2 - 3^2} = 4\end{aligned}$$

故 $\overline{CF} = 1$

$$\text{在 } \triangle EFC \text{ 中, } x^2 = (3-x)^2 + 1^2 \Rightarrow x = \frac{5}{3}$$

$$\begin{aligned}\text{在 } \triangle AEF \text{ 中, } \overline{AE} &= \sqrt{5^2 + x^2} \\ &= \sqrt{5^2 + \left(\frac{5}{3}\right)^2} = \frac{5\sqrt{10}}{3}\end{aligned}$$

* 高中先修課程

P.18

例題 1

- (1) $\sqrt{3+2\sqrt{2}} = \sqrt{2} + \sqrt{1}$
 $= \sqrt{2} + 1$
- (2) $\sqrt{3-2\sqrt{2}} = \sqrt{2} - \sqrt{1}$
 $= \sqrt{2} - 1$
- (3) $\sqrt{11+4\sqrt{6}} = \sqrt{11+2\sqrt{24}}$
 $= \sqrt{8} + \sqrt{3}$
 $= 2\sqrt{2} + \sqrt{3}$
- (4) $\sqrt{14-\sqrt{96}} = \sqrt{14-2\sqrt{24}}$
 $= \sqrt{12} - \sqrt{2}$
 $= 2\sqrt{3} - \sqrt{2}$

練習 1

- (1) $\sqrt{4+2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + \sqrt{1}$
 $= \sqrt{3} + 1$
- (2) $\sqrt{4-2\sqrt{3}} = \sqrt{3} - \sqrt{1}$
 $= \sqrt{3} - 1$
- (3) $\sqrt{18+6\sqrt{5}} = \sqrt{18+2\sqrt{45}}$
 $= \sqrt{15} + \sqrt{3}$
- (4) $\sqrt{14-\sqrt{180}} = \sqrt{14-2\sqrt{45}}$
 $= \sqrt{9} - \sqrt{5}$
 $= 3 - \sqrt{5}$

例題 2

- (1) 依算幾不等式得 $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$
 $\Rightarrow \frac{8}{2} \geq \sqrt{xy}$
 $\Rightarrow 4^2 \geq (\sqrt{xy})^2 \Rightarrow xy \leq 16$
 故 xy 的最大值為 16
- (2) 依算幾不等式得 $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$
 $\Rightarrow \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{16}$
 $\Rightarrow \frac{x+y}{2} \geq 4 \Rightarrow x+y \geq 8$
 故 $x+y$ 的最小值為 8

練習 2

- (1) 依算幾不等式得 $\frac{x+2y}{2} \geq \sqrt{x \cdot 2y}$
 $\Rightarrow \frac{8}{2} \geq \sqrt{2xy}$
 $\Rightarrow 4^2 \geq (\sqrt{2xy})^2 \Rightarrow 16 \geq 2xy \Rightarrow xy \leq 8$
 故 xy 的最大值為 8
- (2) 依算幾不等式得 $\frac{3x+y}{2} \geq \sqrt{3x \cdot y}$
 $\Rightarrow \frac{3x+y}{2} \geq \sqrt{3 \times 27}$
 $\Rightarrow \frac{3x+y}{2} \geq 9 \Rightarrow 3x+y \geq 18$
 故 $3x+y$ 的最小值為 18



先修銜接能力檢定

P.20

簡答

1. $2\sqrt{5}-2\sqrt{2}$ 2. $\sqrt{5}-1$ 3. $\sqrt{10}-3$
4. $4-\sqrt{10}$ 5. $\sqrt{6}+\sqrt{2}$ 6. 64 7. 9 8. $8\sqrt{6}$

詳解


1. $\frac{6}{\sqrt{7+\sqrt{40}}} = \frac{6}{\sqrt{7+2\sqrt{10}}} = \frac{6}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$
 $= \frac{6 \times (\sqrt{5}-\sqrt{2})}{(\sqrt{5}+\sqrt{2}) \times (\sqrt{5}-\sqrt{2})}$
 $= \frac{6 \times (\sqrt{5}-\sqrt{2})}{3} = 2 \times (\sqrt{5}-\sqrt{2})$
 $= 2\sqrt{5}-2\sqrt{2}$
2. $\sqrt{6-\sqrt{20}} = \sqrt{6-2\sqrt{5}} = \sqrt{5}-\sqrt{1} = \sqrt{5}-1$
3. $\sqrt{14+4\sqrt{10}} = \sqrt{14+2\sqrt{40}} = \sqrt{10}+\sqrt{4}$
 $= \sqrt{10}+2 = 5+(\sqrt{10}-3)$
 可得 $a=5$, $b=\sqrt{10}-3$
 所求 $b=\sqrt{10}-3$
4. $\sqrt{35-10\sqrt{10}} = \sqrt{35-2\sqrt{250}} = \sqrt{25}-\sqrt{10}$
 $= 5-\sqrt{10} = 1+(4-\sqrt{10})$
 可得 $a=1$, $b=4-\sqrt{10}$
 所求 $b=4-\sqrt{10}$
5. $\overline{BC}=1 \Rightarrow \overline{BD}=2$ 且 $\overline{CD}=\sqrt{3}$
 又 $\overline{AD}=\overline{BD}=2$ ($\because \triangle ABD$ 為等腰三角形)
 所求 $\overline{AB} = \sqrt{\overline{AC}^2 + \overline{BC}^2} = \sqrt{(2+\sqrt{3})^2 + 1^2}$
 $= \sqrt{8+4\sqrt{3}} = \sqrt{8+2\sqrt{12}}$
 $= \sqrt{6} + \sqrt{2}$
6. 依算幾不等式得 $\frac{x^2+y^2}{2} \geq \sqrt{x^2 \cdot y^2}$
 $\Rightarrow \frac{x^2+y^2}{2} \geq xy \Rightarrow x^2+y^2 \geq 2xy \Rightarrow x^2+y^2 \geq 64$
 故 x^2+y^2 的最小值為 64

7. 如右圖，

設長方形的長為 x ，寬為 y

則周長為 $2x+2y=12$ ，

面積為 xy



依算幾不等式得 $\frac{2x+2y}{2} \geq \sqrt{2x \cdot 2y}$

$$\text{平方} \left(\frac{12}{2} \right)^2 \geq 4xy \Rightarrow xy \leq 9$$


故面積最大值为 9

8. 如右圖，

設長方形的長為 x ，寬為 y

則周長為 $2x+2y$ ，

面積為 $xy=24$



依算幾不等式得 $\frac{2x+2y}{2} \geq \sqrt{2x \cdot 2y}$

$$\Rightarrow \frac{2x+2y}{2} \geq \sqrt{4xy} \Rightarrow \frac{2x+2y}{2} \geq \sqrt{4 \times 24}$$

$$\Rightarrow 2x+2y \geq 8\sqrt{6}$$

故周長最小值为 $8\sqrt{6}$



綜合能力檢定

P.22

簡答

1. 117 2. (B) 3. 50 4. $2\sqrt{2}+2$ 5. $\sqrt{2}-1$

詳解

1. $\sqrt{108} \leq \sqrt{a} < 15$

$$\Rightarrow \sqrt{108} \leq \sqrt{a} < \sqrt{225}$$

滿足條件的 a 可以是 108, 109, …, 224

共有 117 個

2. $10 < \sqrt{108} < 11$

$$\Rightarrow 209 < 2019 + \sqrt{108} < 2030$$

$$\text{檢查: } \begin{cases} 45^2 = 2025 \\ 46^2 = 2116 \end{cases}$$

$$\text{可知 } 45 < \sqrt{2019 + \sqrt{108}} < 46$$

且 $\sqrt{2019 + \sqrt{108}}$ 最接近 45


故選(B)

3. 如右圖，設長方形的

長為 x ，寬為 y

則繩長為 $x+2y=20$ ，

面積為 xy



依算幾不等式得 $\frac{x+2y}{2} \geq \sqrt{x \cdot 2y}$

$$\text{平方} \left(\frac{20}{2} \right)^2 \geq (\sqrt{2xy})^2 \Rightarrow 100 \geq 2xy$$

$$\Rightarrow xy \leq 50$$

$\therefore$ 面積最大為 50 平方公尺

4. 依相似定理得

$$\overline{CD}^2 = \overline{AC} \times \overline{BC}$$

$$\Rightarrow \overline{CD} = \pm \sqrt{\overline{AC} \times \overline{BC}} \text{ (取正)}$$

$$\text{則 } \overline{CD} = \sqrt{(3+2\sqrt{2}) \times 4}$$

$$= \sqrt{12+8\sqrt{2}}$$


$$= \sqrt{12+2\sqrt{32}}$$

$$= \sqrt{8} + \sqrt{4} = 2\sqrt{2} + 2$$

5. $\overline{BC}=1 \Rightarrow \overline{BD}=\sqrt{2}$ 且 $\overline{CD}=1$

又 $\overline{AD}=\overline{BD}=\sqrt{2}$ ($\because \triangle ABD$ 為等腰三角形)

$$\begin{aligned} \text{所求 } \frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} &= \frac{1}{\sqrt{2}+1} = \frac{1 \times (\sqrt{2}-1)}{(\sqrt{2}+1) \times (\sqrt{2}-1)} \\ &= \frac{\sqrt{2}-1}{1} = \sqrt{2}-1 \end{aligned}$$



單元 3 數列與級數

★ 國中基礎能力檢定

P.25

簡答

1. 30 2. 2 3. 29 4. 50 5. 16 6. 24
7. (A)(B)(D) 8. 16 9. (1) -2 ; (2) -8 ; (3) 9
10. 330 11. (A) 12. 465

詳解

1. 首項 $a_1=100$ ，公差 $d=98-100=-2$

$$\text{所求第 36 項 } a_{36} = a_1 + 35d$$

$$= 100 + 35 \times (-2)$$

$$= 30$$

2. 首項 $a_1=-50$ ，第 51 項 $a_{51}=50$

$$\text{由 } a_{51} = a_1 + 50d$$

$$\Rightarrow 50 = -50 + 50d \Rightarrow d=2$$

所求公差 $d=2$

3. 由第三列：3, f , -25 成等差

$$\Rightarrow f = \frac{3 + (-25)}{2} = -11$$

由第二行：b, 9, f 成等差

$$\Rightarrow 9 = \frac{b+f}{2} \Rightarrow 9 = \frac{b+(-11)}{2}$$

$$\Rightarrow b=29$$

所求 $b=29$

4. 設首項為 a_1 ，公差為 d

$$\begin{cases} a_2 = a_1 + d = 12 \\ a_9 = a_1 + 8d = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 14 \\ d = -2 \end{cases}$$

所有項的和為

$$\frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d]$$

$$= \frac{10}{2} \times [2 \times 14 + (10-1) \times (-2)] = 50$$

5. 首項 $a_1 = -113$ ，公差 $d = (-105) - (-113) = 8$
 則第 n 項 $a_n = a_1 + (n-1)d$
 $= -113 + (n-1) \times 8 > 0$

$$\Rightarrow 8(n-1) > 113$$

$$\Rightarrow n > 15 \frac{1}{8}$$

符合條件的最小自然數為 16

故自第 16 項開始為正數

6. 周長為 24，得設三邊長為 $8-d$ ， 8 ， $8+d$ ，
 其中 $d > 0$

$$\text{直角三角形} \Rightarrow (8+d)^2 = 8^2 + (8-d)^2$$

$$\Rightarrow d = 2$$

可得三邊長為 6，8，10

$$\text{所求面積為 } \frac{6 \times 8}{2} = 24$$

7. (A) ○：公比 $r = 1$
 (B) ○：公比 $r = -1$
 (C) ×：不是等比數列
 (D) ○：公比 $r = \frac{1}{2}$
 (E) ×：不是等比數列
 故選(A)(B)(D)

8. 依題意 $12^2 = 9 \times \alpha \Rightarrow \alpha = 16$

9. (1) 公比 $r = \frac{a_3}{a_2} = \frac{-32}{16} = -2$

$$(2) a_2 = a_1 r \Rightarrow 16 = a_1 \times (-2) \Rightarrow \text{首項 } a_1 = -8$$

$$(3) a_n = a_1 r^{n-1} \Rightarrow -2048 = (-8) \times (-2)^{n-1}$$

$$\Rightarrow (-2)^{n-1} = 256 \Rightarrow n-1 = 8$$

$$\Rightarrow n = 9$$

$\therefore -2048$ 是第 9 項

10. 已知 $a_6 = 20$ 且 $d = 1$

$$\text{由 } a_6 = a_1 + 5d \Rightarrow 20 = a_1 + 5 \times 1$$

$$\Rightarrow a_1 = 15$$

$$\text{故座位總數為 } \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d]$$

$$= \frac{15}{2} [2 \times 15 + (15-1) \times 1]$$

$$= 330 (\text{個})$$

11. 依題意 $n^2 = \frac{(n+2) \times [1 + (n+2)]}{2}$

$$\Rightarrow n^2 - 5n - 6 = 0$$

$$\Rightarrow (n-6) \times (n+1) = 0$$

$$\Rightarrow n = 6 \text{ 或 } n = -1 (\text{不合})$$

則全部的球有 $6^2 = 36$ 個

故選(A)

$$12. 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 30 = \frac{30 \times (1 + 30)}{2}$$

$$= 465$$

故大寶總共可以得到 465 元

高中先修課程

P.29

例題 1

- (1) 首項 $a_1 = 1$ ， $r = 2$

$$a_n = a_1 r^{n-1} \Rightarrow 128 = 1 \times 2^{n-1}$$

$$\Rightarrow n = 8$$

此級數共有 8 項

$$\text{總和為 } \frac{a_1 (r^n - 1)}{r - 1} = \frac{1 \times (2^8 - 1)}{2 - 1}$$

$$= 255$$

- (2) 首項 $a_1 = 2$ ，公比 $r = -2$

$$a_n = a_1 r^{n-1} \Rightarrow 128 = 2 \times (-2)^{n-1}$$

$$\Rightarrow n = 7$$

此級數共有 7 項

$$\text{總和為 } \frac{a_1 (1 - r^n)}{1 - r} = \frac{2 \times [1 - (-2)^7]}{1 - (-2)}$$

$$= 86$$

練習 1

- (1) 首項 $a_1 = 1$ ，公比 $r = 3$

$$a_n = a_1 r^{n-1} \Rightarrow 243 = 1 \times 3^{n-1}$$

$$\Rightarrow 3^{n-1} = 3^5$$

$$\Rightarrow n-1 = 5$$

$$\Rightarrow n = 6$$

此級數有 6 項

$$\text{總和為 } \frac{a_1 (r^n - 1)}{r - 1} = \frac{1 \times (3^6 - 1)}{3 - 1}$$

$$= 364$$

- (2) 首項 $a_1 = 3$ ，公比 $r = -3$

$$a_n = a_1 r^{n-1} \Rightarrow 243 = 3 \times (-3)^{n-1}$$

$$\Rightarrow (-3)^{n-1} = 81$$

$$\Rightarrow n-1 = 4$$

$$\Rightarrow n = 5$$

此級數共有 5 項

$$\text{總和為 } \frac{a_1 (1 - r^n)}{1 - r} = \frac{3 [1 - (-3)^5]}{1 - (-3)}$$

$$= 183$$

例題 2

$$(1) 1 + 2 + 3 + \cdots + 100 = \sum_{k=1}^{100} k$$

$$(2) 1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + 99 = \sum_{k=1}^{50} (2k-1)$$

$$(3) 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{10} = \sum_{k=1}^{10} 2^k$$

練習 2

$$(1) 2+4+6+\cdots+100=\sum_{k=1}^{50} 2k$$

$$(2) 3+3^2+3^3+\cdots+3^{10}=\sum_{k=1}^{10} 3^k$$

例題 3

(1) 以單利計息，本利和為

$$10000 \times (1+5\% \times 3) = 11500 \text{ (元)}$$

(2) 以複利計息，本利和為

$$\begin{aligned} 10000 \times (1+5\%)^3 &= 10000 \times 1.157625 \\ &= 11576.25 \\ &\approx 11576 \text{ (元)} \end{aligned}$$

練習 3

(1) 以單利計息，本利和為

$$100000 \times (1+2\% \times 3) = 106000 \text{ (元)}$$

(2) 以複利計息，本利和為

$$\begin{aligned} 100000 \times (1+2\%)^3 &= 100000 \times 1.061208 \\ &= 106120.8 \\ &\approx 106121 \text{ (元)} \end{aligned}$$



先修銜接能力檢定

P.32

簡答

1. 45 2. $\frac{15}{8}$ 3. $\sum_{k=1}^{10} (3^k + 5k)$ 4. $\frac{364}{243}$
5. 13310 6. 36410 7. 40211 8. 1073741823

詳解

$$1. \text{ 前 4 項的和 } S_4 = \frac{a_1(r^4-1)}{r-1} = \frac{3 \times (2^4-1)}{2-1} = 45$$

2. 前 4 項的和

$$S_4 = \frac{a_1(1-r^4)}{1-r} = \frac{3 \times \left[1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^4\right]}{1 - \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{15}{8}$$

$$\begin{aligned} 3. (3+5 \times 1) + (3^2+5 \times 2) + (3^3+5 \times 3) + \cdots \\ + (3^{10}+5 \times 10) &= \sum_{k=1}^{10} (3^k + 5k) \end{aligned}$$

4. 首項 $a_1=2$ ，公比 $r=-\frac{1}{3}$ ，此級數共有 6 項

$$\text{總和為 } \frac{a_1(1-r^6)}{1-r} = \frac{2 \times \left[1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^6\right]}{1 - \left(-\frac{1}{3}\right)} = \frac{364}{243}$$

5. 以複利計息，本利和為

$$\begin{aligned} 10000 \times (1+10\%)^3 &= 10000 \times 1.331 \\ &= 13310 \text{ (元)} \end{aligned}$$

6. 本利和為

$$\begin{aligned} &10000 \times (1+10\%)^3 + 10000 \times (1+10\%)^2 \\ &+ 10000 \times (1+10\%) \\ &= 13310 + 12100 + 11000 \\ &= 36410 \text{ (元)} \end{aligned}$$

$$7. \begin{array}{c} 10 \text{ 萬} \\ \hline \begin{array}{ccc} & A & A & A \\ & | & | & | \\ \hline \end{array} \end{array}$$

還清
假設每年平均還款 A 元，則

$$\begin{aligned} &100000 \times (1+10\%)^3 \\ &= A \times (1+10\%)^2 + A(1+10\%) + A \\ &\Rightarrow 133100 = 1.21A + 1.1A + A \\ &\Rightarrow 133100 = 3.31A \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A = \frac{133100}{3.31} \approx 40211.48 \approx 40211 \text{ (元)}$$

故小銘每年平均還款 40211 元

$$8. 1+2+2^2+2^3+\cdots+2^{29}$$

$$= \frac{1 \times (2^{30}-1)}{2-1} = 2^{30}-1$$

$$= 1073741823$$

故二寶總共可以得到 1073741823 元



綜合能力檢定

P.34

簡答

1. (1) 2 ; (2) -3 ; (3) 11 ; (4) 12
2. (1) $\frac{1}{2}$; (2) 80 ; (3) $\frac{5}{8}$; (4) $\frac{315}{2}$ 3. 102
4. 480 5. $\frac{3069}{64}$

詳解

1. (1) 設首項 a_1 ，公差 d

$$\begin{cases} a_3 = a_1 + 2d = 1 \\ a_5 = a_1 + 4d = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = -3 \\ d = 2 \end{cases}$$

則公差 $d=2$

(2) 首項 $a_1=-3$

$$(3) a_8 = a_1 + 7d = (-3) + 7 \times 2 = 11$$

(4) 前 6 項的總和為

$$\begin{aligned} &\frac{6 \times [2a_1 + (6-1) \times d]}{2} \\ &= \frac{6 \times [2 \times (-3) + 5 \times 2]}{2} = 12 \end{aligned}$$

2. (1) 設首項 a_1 ，公比 r

$$\begin{cases} a_3 = a_1 r^2 = 20 \\ a_5 = a_1 r^4 = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 80 \\ r = \pm \frac{1}{2} \text{ (取正)} \end{cases}$$

則公比 $r = \frac{1}{2}$

(2) 首項 $a_1=80$ (3) $a_8=a_1r^7$

$$=80 \times \left(\frac{1}{2}\right)^7 = 80 \times \frac{1}{128} = \frac{5}{8}$$

(4) 前 6 項的總和為

$$\frac{a_1(1-r^6)}{1-r} = \frac{80 \times \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^6\right]}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{315}{2}$$

$$\begin{aligned} 3. \sum_{k=1}^4 (3^k - 3k + 3) \\ &= (3^1 - 3 \times 1 + 3) + (3^2 - 3 \times 2 + 3) \\ &\quad + (3^3 - 3 \times 3 + 3) + (3^4 - 3 \times 4 + 3) \\ &= 3 + 6 + 21 + 72 = 102 \end{aligned}$$

4. 已知座位數公差 $d=2$ 設第 n 排座位數為 a_n

$$a_7 = a_1 + 6d \Rightarrow 30 = a_1 + 6 \times 2 \Rightarrow a_1 = 18$$

$$\begin{aligned} \text{座位總數} &= \frac{15 \times [2a_1 + (15-1) \times d]}{2} \\ &= \frac{15 \times (2 \times 18 + 14 \times 2)}{2} = 480 \end{aligned}$$

故共有 480 個座位

5. $S_1 + S_2 + S_3 + S_4 + S_5$

$$\begin{aligned} &= 6^2 + \left(\frac{6}{2}\right)^2 + \left(\frac{6}{2^2}\right)^2 + \left(\frac{6}{2^3}\right)^2 + \left(\frac{6}{2^4}\right)^2 \\ &= \frac{6^2 \times \left[1 - \left(\frac{1}{4}\right)^5\right]}{1 - \frac{1}{4}} \quad \left(\text{註：首項為 } 6^2, \text{ 公比為 } \frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{3069}{64} \text{ (平方公分)} \end{aligned}$$

單元 4 坐標與函數

★ 國中基礎能力檢定

P.38

簡答

1. -3 2. (C) 3. 45 4. (0, 3) 5. $\frac{12}{5}$
 6. $y = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$ 7. (B) 8. (D) 9. 15 10. 2
 11. -1.6 12. (-12, 17)

詳解

1. 所求為 $f(1) + f(2) + f(-3)$
 $= (3 \times 1 - 1) + (3 \times 2 - 1) + [3 \times (-3) - 1]$
 $= 2 + 5 + (-10)$
 $= -3$

x	0	$-\frac{b}{a}$
y	b	0

其中 $b > 0$, $-\frac{b}{a} > 0$ 如右圖, $y = ax + b$ 圖形

不通過第三象限

故選(C)

$$3. \begin{cases} f(66) = 66a + b = 89 \\ f(99) = 99a + b = 111 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \frac{2}{3} \\ b = 45 \end{cases}$$

$$\therefore f(x) = \frac{2}{3}x + 45$$


故所求 $f(0) = 45$ 4. ① 水平直線 $\Rightarrow a = 0$ ② 又通過 $(-4, 3) \Rightarrow b = 3$ 故所求數對 $(a, b) = (0, 3)$ 5. $L: 3x + 4y - 12 = 0$

x	0	4
y	3	0

直線 L 與坐標軸交於 $A(4, 0)$, $B(0, 3)$ 令 O 到 L 的最小距離為 h

如右圖

$$\begin{aligned} h &= \frac{\overline{OA} \times \overline{OB}}{\overline{AB}} \\ &= \frac{4 \times 3}{5} = \frac{12}{5} \end{aligned}$$

6. 由頂點 $(1, 2)$ 代入 $y = a(x-h)^2 + k$

$$\text{得 } y = a(x-1)^2 + 2$$

$$\text{過 } (3, 4), \text{ 代入得 } 4 = 4a + 2 \Rightarrow a = \frac{1}{2}$$


$$\text{所求為 } y = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$$

7. $y = f(x) = -2(x-3.3)^2 + 4$ 的圖形開口向下, 頂點為 $(3.3, 4)$ 若 x 值愈靠近 3.3,則 $f(x)$ 值愈大

故選(B)

8. $y = f(x) = 2(x-3.3)^2 - 4$ 的圖形開口向上, 頂點為 $(3.3, -4)$ 若 x 值離 3.3 愈遠,則 $f(x)$ 值愈大

故選(D)



9. 令 $y=0$

$$\Rightarrow x^2+9x-36=0$$


$$\Rightarrow (x-3)(x+12)=0$$

$$\Rightarrow x=3 \text{ 或 } x=-12$$

設 $A(3, 0)$, $B(-12, 0)$

則 $\overline{AB}$ 的長度為

$$|3-(-12)|=15$$



10. $y=x^2+3$ 向右平移 k 單位 $\rightarrow y=(x-k)^2+3$

過 $(0, 7)$, 代入得 $7=(0-k)^2+3$

$$\Rightarrow k^2=4 \Rightarrow k=\pm 2 (\text{取正 } \because k>0)$$

所求 $k=2$

$$11. 20-0.6 \times \frac{3600}{100} = -1.6$$

故所求溫度為 -1.6 度

$$12. \text{由題圖可知 } y=2(x-3)^2-1=2(x^2-6x+9)-1 \\ =2x^2-12x+17$$

與 $y=2x^2+bx+c$ 同義

可得 $b=-12$, $c=17$

所求數對 $(b, c)=(-12, 17)$

高中先修課程

P.42

例題 1

$$(1) x = \frac{(-3) \times 2 + 11 \times 5}{5+2} = 7$$

$$(2) \text{ 設 } P(x, y), \text{ 則 } x = \frac{1 \times 3 + 11 \times 2}{2+3} = 5,$$

$$y = \frac{(-3) \times 3 + 12 \times 2}{2+3} = 3$$

故點 $P(5, 3)$

練習 1

$$(1) x = \frac{3 \times 1 + (-9) \times 2}{2+1} = -5$$

(2) 設 $Q(x, y)$

$$\text{則 } x = \frac{(-3) \times 3 + 4 \times 4}{4+3} = 1,$$

$$y = \frac{2 \times 3 + 9 \times 4}{4+3} = 6$$

故點 $Q(1, 6)$

例題 2

$$(1) f(x) = (x^2+4x)+3 = (x^2+2 \cdot 2 \cdot x+2^2)+3-2^2 \\ = (x+2)^2-1$$

$\therefore$ 頂點為 $(-2, -1)$

$$(2) f(x) = -(x^2-2x)+5$$

$$= -(x^2-2 \cdot 1 \cdot x+1^2)+5+1^2$$

$$= -(x-1)^2+6$$

$\therefore$ 頂點為 $(1, 6)$

$$(3) f(x) = 3(x^2-6x)-27$$

$$= 3(x^2-2 \cdot 3 \cdot x+3^2)-27-3 \cdot 3^2$$

$$= 3(x-3)^2-54$$

$\therefore$ 頂點為 $(3, -54)$

練習 2

$$(1) f(x) = (x^2-4x)+9$$

$$= (x^2-2 \cdot 2 \cdot x+2^2)+9-2^2$$

$$= (x-2)^2+5$$

$\therefore$ 頂點為 $(2, 5)$

$$(2) f(x) = -(x^2+2x)+5$$

$$= -(x^2+2 \cdot 1 \cdot x+1^2)+5+1^2$$

$$= -(x+1)^2+6$$

$\therefore$ 頂點為 $(-1, 6)$

$$(3) f(x) = -2(x^2+x)-2$$

$$= -2 \left[x^2+2 \cdot \frac{1}{2} \cdot x + \left(\frac{1}{2} \right)^2 \right] - 2 + 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^2$$

$$= -2 \left(x + \frac{1}{2} \right)^2 - \frac{3}{2}$$

$\therefore$ 頂點為 $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2} \right)$

先修銜接能力檢定

P.44

簡答

1. 3 2. -20 3. $(3, 1)$ 4. $(-5, 9)$

5. (1) $(-2, -1)$; (2) $\left(\frac{1}{2}, -\frac{7}{4} \right)$;

(3) $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{15}{2} \right)$; (4) $\left(\frac{1}{6}, \frac{25}{12} \right)$

6. 168 7. 6 8. 450

詳解

$$1. x = \frac{(-5) \times 3 + 15 \times 2}{2+3} = 3$$

$$2. \text{ 依題意 } \frac{a+18}{2} = -1$$

$$\Rightarrow a = -20$$

3. 設 $Q(x, y)$

$$\text{則 } x = \frac{1 \times 5 + 13 \times 1}{1+5} = 3$$

$$y = \frac{(-2) \times 5 + 16 \times 1}{1+5} = 1$$

故點 $Q(3, 1)$

$$4. \text{ 依題意, } \begin{cases} \frac{a+3}{2} = -1 \\ \frac{-5+b}{2} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -5 \\ b = 9 \end{cases}$$

故數對 $(a, b) = (-5, 9)$

$$5. (1) x^2 + 4x + 3 = (x^2 + 2 \cdot 2 \cdot x + 2^2) + 3 - 2^2 \\ = (x+2)^2 - 1$$

$\therefore$ 數對 $(p, q) = (-2, -1)$

$$(2) -x^2 + x - 2 \\ = -(x^2 - x) - 2 \\ = -\left[x^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot x + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] - 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{7}{4}$$

$\therefore$ 數對 $(p, q) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{7}{4}\right)$

$$(3) 2x^2 + 6x - 3 = 2(x^2 + 3x) - 3 \\ = 2\left[x^2 + 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot x + \left(\frac{3}{2}\right)^2\right] - 3 - 2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ = 2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{15}{2}$$

$\therefore$ 數對 $(p, q) = \left(-\frac{3}{2}, -\frac{15}{2}\right)$

$$(4) -3x^2 + x + 2 = -3\left(x^2 - \frac{1}{3}x\right) + 2 \\ = -3\left[x^2 - 2 \cdot \frac{1}{6} \cdot x + \left(\frac{1}{6}\right)^2\right] + 2 + 3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \\ = -3\left(x - \frac{1}{6}\right)^2 + \frac{25}{12}$$

$\therefore$ 數對 $(p, q) = \left(\frac{1}{6}, \frac{25}{12}\right)$

$$6. f(x) = 2x^2 - 8x + m = 2(x^2 - 4x) + m \\ = 2(x-2)^2 + m - 8$$

當 $x=2$ 時, $f(x)$ 有最小值 $m-8$

$$\text{即 } m-8=160 \Rightarrow m=168$$

$$7. y = x^2 + 6x + 3 \\ \Rightarrow y = (x+3)^2 - 6$$

頂點為 $(-3, -6)$

上移 6 單位,

新圖形和 x 軸恰交於一點

故所求 $k=6$

$$8. \text{如右圖, 設長方形的兩} \\ \text{邊分別為 } x, y \text{ 公尺} \\ \Rightarrow 2x + y = 60$$

面積為 xy


$$= x(60-2x) = -2x^2 + 60x$$

$$= -2(x^2 - 30x)$$

$$= -2(x-15)^2 + 450$$

當 $x=15$ 時, 有最大值 450

故最大面積為 450 平方公尺



簡答

1. 10.94 2. 26 3. $(6, -3)$ 4. (D)(E) 5. (D)

詳解

$$1. \text{依題意 } 5.97 = k \times 50 + 1 \Rightarrow k = \frac{4.97}{50}$$

$$\text{可得 } p = \frac{4.97}{50} \times d + 1$$

當 $d=100$ 代入

$$\Rightarrow p = \frac{4.97}{50} \times 100 + 1$$

$$= 10.94 \text{ (個大氣壓)}$$

$$2. f(x) = (x-2)^2 + x^2 + (x+5)^2 \\ = 3x^2 + 6x + 29 \\ = 3(x^2 + 2x) + 29 \\ = 3(x+1)^2 + 26$$

當 $x=-1$ 時, $f(x)$ 有最小值 26

$$3. \text{設 } P(x, y)$$

$$\text{則 } x = \frac{1 \times 3 + 9 \times 5}{5 + 3} = 6,$$

$$y = \frac{2 \times 3 + (-6) \times 5}{5 + 3} = -3$$

故點 $P(6, -3)$

$$4. f(x) = 2x^2 + 4x + k \\ = 2(x^2 + 2x) + k \\ = 2(x^2 + 2 \cdot 1 \cdot x + 1^2) + k - 2 \cdot 1^2 \\ = 2(x+1)^2 + k - 2$$

則頂點為 $(-1, k-2)$

如右圖


二次函數圖形和 x 軸沒有交點

$\Rightarrow$ 頂點 $(-1, k-2)$ 在 x 軸上方

$$\Rightarrow k-2 > 0$$

$$\Rightarrow k > 2$$

故選(D)(E)



$$5. \text{依題意 } |p-2| : |p-10| = \sqrt{7} : \sqrt{6} = 1 : \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{7}}$$

$$|q-2| : |q-10| = \sqrt{8} : \sqrt{7} = 1 : \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{8}}$$

$$|r-2| : |r-10| = \sqrt{6} : \sqrt{5} = 1 : \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}} < \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{7}} < \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{8}}$$

$\therefore r$ 最靠近 10, 其次為 p , 再其次為 q

得 $r > p > q$

故選(D)

單元 5 三角比

★ 國中基礎能力檢定

P.52

簡答

- 132
- 110
- 17
- $\sqrt{5}$
- 100
- (1) $\frac{22}{3}$; (2) $\frac{4}{9}$
- $2\sqrt{6}$
- 144
- $\frac{5}{2}$
- 8
- (1) $\frac{3}{5}$; (2) $\frac{4}{5}$; (3) $\frac{3}{4}$; (4) $\frac{4}{5}$; (5) $\frac{3}{5}$; (6) $\frac{4}{3}$
- (1) $\sqrt{29}$; (2) $\sqrt{41}$

詳解

- $$\angle BAC = \frac{(5-2) \times 180^\circ}{5} = 108^\circ$$

$$\angle BAD = \frac{(6-2) \times 180^\circ}{6} = 120^\circ$$

故 $\angle CAD = 360^\circ - 108^\circ - 120^\circ = 132^\circ$
- 依外角定理得

$$\theta = 50^\circ + (180^\circ - 120^\circ) = 110^\circ$$
- ∵ 三角形任意兩邊和大於第三邊，且任意兩邊差小於第三邊

可知 $16 - 9 < x - 5 < 16 + 9$
 $\Rightarrow 12 < x < 30$
 $\therefore$ 滿足條件的 x 可以是 13, 14, 15, …, 29, 共 17 個
- 由畢氏定理，依序求得

$$\overline{OB} = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \overline{OC} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{3}$$

$$\Rightarrow \overline{OD} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{4}$$

$$\Rightarrow \overline{OE} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{4})^2} = \sqrt{5}$$

故 $\overline{OE} = \sqrt{5}$
- 正方形 $ACHI$ 面積為 $\overline{AC}^2$

$$= \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2$$


$$= 36 + 64$$

$$= 100$$
- (1) $\overline{AD} : \overline{AB} = 6 : 9 = 2 : 3$
 $\overline{AE} : \overline{AC} = 8 : 12 = 2 : 3$
 $\Rightarrow \overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$
 $\Rightarrow \triangle ADE \sim \triangle ABC$
 可得 $\overline{DE} : \overline{BC} = 2 : 3$
 $\Rightarrow \overline{DE} : 11 = 2 : 3 \Rightarrow \overline{DE} = \frac{22}{3}$

(2) $\triangle ADE$ 面積與 $\triangle ABC$ 面積的比值為

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

- 如右圖，作 $\overline{AD}$, $\overline{BD}$ 連線，依直角三角形母子相似定理可得



$$\overline{CD}^2 = \overline{AC} \times \overline{BC}$$

$$= 8 \times 3 = 24$$

$$\text{故 } \overline{CD} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$$

- $\angle 1 = 180^\circ - 108^\circ = 72^\circ$

$$\text{故 } \angle 2 = 2\angle 1 = 2 \times 72^\circ = 144^\circ$$


- 依內分比性質得

$$\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{BA} : \overline{AC} = 5 : 7$$

$$\text{故 } \overline{BD} = \frac{5}{5+7} \times \overline{BC}$$

$$= \frac{5}{12} \times 6 = \frac{5}{2}$$

- 如下圖，由 B 向 $\overline{AD}$ 作垂直線，垂足為 E



$$\text{則 } \overline{BE} = \overline{AB} \times \frac{1}{2} = 6 \times \frac{1}{2} = 3$$


$$\text{故 } \overline{CD} = 2 \times \sqrt{5^2 - 3^2} = 2 \times 4 = 8$$

- (1) $\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{3}{5}$; (2) $\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{4}{5}$; (3) $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}} = \frac{3}{4}$;


$$(4) \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{4}{5}; (5) \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{3}{5}; (6) \frac{\overline{AC}}{\overline{BC}} = \frac{4}{3}$$

- (1) 空間中， $\overline{OR} = \sqrt{2^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{29}$ 為最短路徑長

- 將長方體展開成平面，考慮下列兩個情形



$$\Rightarrow \overline{OR} = \sqrt{(2+3)^2 + 4^2} = \sqrt{41}$$



$$\Rightarrow \overline{OR} = \sqrt{(4+3)^2 + 2^2} = \sqrt{53}$$

綜合①、②，最短路徑長為 $\sqrt{41}$

高中先修課程

P.55

例題 1

- 底邊上的高為 $\sqrt{15^2 - 9^2} = 12$

$$\text{故 } x = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$$

$$(2) \begin{cases} m^2 - n^2 = 6^2 - 3^2 = 27 \\ m^2 + n^2 = 6^2 + 3^2 = 45 \\ 2mn = 2 \times 6 \times 3 = 36 \end{cases}$$

故三邊長為 27, 36, 45

練習 1

$$(1) x = (3 \times \sqrt{3}) \times 2 = 6\sqrt{3}$$

$$(2) \begin{cases} m^2 - n^2 = 5^2 - 1^2 = 24 \\ m^2 + n^2 = 5^2 + 1^2 = 26 \\ 2mn = 2 \times 5 \times 1 = 10 \end{cases}$$

故三邊長為 10, 24, 26

例題 2

$$(1) \sin^2 23^\circ + \sin^2 37^\circ + \cos^2 23^\circ + \cos^2 37^\circ \\ = (\sin^2 23^\circ + \cos^2 23^\circ) + (\sin^2 37^\circ + \cos^2 37^\circ) \\ = 1 + 1 = 2$$

$$(2) \text{由 } 2 \sin \theta = 3 \cos \theta \Rightarrow \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3}{2} \\ \Rightarrow \tan \theta = \frac{3}{2}$$

$$(3) \sin 23^\circ = \sin(90^\circ - 67^\circ) = \cos 67^\circ \\ \text{故選(C)}$$

練習 2

$$(1) \text{所求為 } 1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$(2) \text{由 } 3 \cos \theta - \sin \theta = 0 \\ \Rightarrow 3 \cos \theta = \sin \theta \Rightarrow \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{3}{1} \Rightarrow \tan \theta = 3$$

$$(3) \cos 37^\circ = \cos(90^\circ - 53^\circ) = \sin 53^\circ \\ \text{故選(B)}$$



先修銜接能力檢定

P.58

簡答

$$1. 289 \quad 2. (1) \frac{\sqrt{3}}{2}; (2) \frac{1}{2}; (3) \sqrt{3}$$

$$3. (1) 10; (2) \frac{5}{13}; (3) \frac{5}{12} \quad 4. 12.59 \quad 5. 6$$

$$6. \sqrt{1-t^2} \quad 7. \frac{5}{12} \quad 8. 2\frac{1}{2}$$

詳解

$$1. \text{正方形的面積為 } 15^2 + 8^2 = 289$$

$$2. (1) \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(2) \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

$$(3) \tan 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{1} \\ = \sqrt{3}$$

$$3. (1) x = \sqrt{26^2 - 24^2} \\ = 10$$

$$(2) \sin A = \frac{10}{26} = \frac{5}{13}$$

$$(3) \tan A = \frac{10}{24} = \frac{5}{12}$$

$$4. \tan 40^\circ = \frac{h}{15} \Rightarrow 0.8391 \approx \frac{h}{15} \\ \Rightarrow h \approx 15 \times 0.8391 \\ \approx 12.5865 \\ \approx 12.59$$

5. 設路燈 h 公尺

$$3 : (3+7) = 1.8 : h \\ \Rightarrow 3h = 18$$

$$\Rightarrow h = 6$$

故路燈高度為 6 公尺

6. 依平方關係公式得 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta = 1 - t^2$$

$$\Rightarrow \sin \theta = \pm \sqrt{1-t^2} \quad (\text{取正 } \because 0 < \sin \theta < 1)$$

$$\text{故 } \sin \theta = \sqrt{1-t^2}$$

$$7. \frac{\cos \theta + 2 \sin \theta}{\cos \theta - 2 \sin \theta} = 11$$

$$\Rightarrow \cos \theta + 2 \sin \theta = 11 \cos \theta - 22 \sin \theta$$

$$\Rightarrow 24 \sin \theta = 10 \cos \theta$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{10}{24}$$

$$\Rightarrow \tan \theta = \frac{5}{12}$$

$$8. \sin^2 15^\circ + \sin^2 25^\circ + \sin^2 45^\circ + \sin^2 65^\circ + \sin^2 75^\circ$$

$$= (\sin^2 15^\circ + \sin^2 75^\circ) + (\sin^2 25^\circ + \sin^2 65^\circ) \\ + \sin^2 45^\circ$$

$$= (\sin^2 15^\circ + \cos^2 15^\circ) + (\sin^2 25^\circ + \cos^2 25^\circ)$$

$$+ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$$

$$= 1 + 1 + \frac{1}{2}$$

$$= 2\frac{1}{2}$$



綜合能力檢定

P.60

簡答


$$1. 2 - \sqrt{3} \quad 2. 6 \quad 3. 24 \quad 4. \frac{4}{5}$$

$$5. 60\sqrt{3} + 60\sqrt{2}$$

詳解


1. 如右圖

$$\tan 15^\circ = \frac{1}{2 + \sqrt{3}} = 2 - \sqrt{3}$$



2. 設圓半徑為 R

如下圖，作直徑 AD



$$\angle ADB = \angle ACB = 30^\circ$$

在 $\triangle ABD$ 中， $\angle ABD = 90^\circ$

(半圓內圓周角 90°)

$$\sin 30^\circ = \frac{AB}{AD} \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{6}{2R} \Rightarrow R = 6$$

故外接圓半徑為 6

3. 斜邊為 $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10$

鋪色部分面積為

$$\frac{1}{2} \times 3^2 \pi + \frac{1}{2} \times 4^2 \pi - \left(\frac{1}{2} \times 5^2 \pi - \frac{6 \times 8}{2} \right) = 24$$

(註：鋪色部分面積 = 直角三角形面積)

4. $2 \sin \theta - \cos \theta - 1 = 0$

$$\Rightarrow \cos \theta = 2 \sin \theta - 1$$

$$\xrightarrow{\text{平方}} \cos^2 \theta = (2 \sin \theta - 1)^2$$

$$\Rightarrow 1 - \sin^2 \theta = 4 \sin^2 \theta - 4 \sin \theta + 1$$

$$\Rightarrow 5 \sin^2 \theta - 4 \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow \sin \theta (5 \sin \theta - 4) = 0$$

$$\Rightarrow \sin \theta = 0 (\text{不合}) \text{ 或 } \sin \theta = \frac{4}{5}$$

$$\text{故所求 } \sin \theta = \frac{4}{5}$$

5. 設木棍 $AB = A'B' = x$ 公分

$$\Rightarrow \begin{cases} \overline{BC} = \frac{1}{\sqrt{2}} x \\ \overline{B'C} = \frac{\sqrt{3}}{2} x \end{cases}$$

$$\text{則 } \overline{B'C} - \overline{BC} = 30$$

$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} x - \frac{1}{\sqrt{2}} x = 30$$


$$\Rightarrow \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2} x = 30$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x &= \frac{60}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \\ &= 60(\sqrt{3} + \sqrt{2}) \\ &= 60\sqrt{3} + 60\sqrt{2} \end{aligned}$$


故木棍長度為 $60\sqrt{3} + 60\sqrt{2}$ 公分

單元 6 立體圖與三視圖


例題 1



前視圖




右視圖




俯視圖


練習 1



前視圖



右視圖



俯視圖

例題 2

(C)

練習 2

(A)

Notes

Notes



高中數學先修教材

編著者：黃天賜

主編：李遠茵

企劃編輯：高湘婷

責任編輯：吳崇欽·吳界

美術編輯：方淑莉·蔡佳岐

封面設計：黃屏慈

插畫：鄭妃雅·周秋慧·黃慧貞

出版者：翰林出版事業股份有限公司

印刷者：翰林出版事業股份有限公司

總公司：70248 臺南市南區新樂路 76 號

電話：(06)2631188

傳真：(06)2640416

教材勘誤：翰林官網 / Q&A 專區 / 勘誤啟事

廣告代理商：福廣廣告事業有限公司

電話：(02)27555898

翰林官網：<http://www.hle.com.tw>



網路購書

翰林書城：<http://books.hanlin.com.tw>

書城提供 ATM、線上刷卡及貨到付款的服務，建議您可以直接至翰林書城訂購，約 3 ~ 4 個工作天即可收到書（不含假日）。



讀者服務

客服專線：(06)2637923

客服信箱：hlservice@hanlin.com.tw

本書如有缺頁、倒裝、漏印、嚴重汙損等情形，請接受本公司誠摯的道歉；並請撥打客服專線告知，我們將迅速為您服務。

有著作權 請勿侵害

本公司已盡力完成著作權授權使用等問題，倘若有疏漏，請著作權所有人或知悉者與本公司編輯人員聯絡。

- 本公司各產品之註冊商標，請勿冒用以免觸法。若有侵權行為，將依法追究絕不寬貸。